

## Umgang mit Isotretinoin-Verordnungen

**1** Geb.-pl. **1** → Tretin Isolde

**2** Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen) **2** → IsoGalen 10 mg Weichkapseln  
30 St. N1  
Dos: 1 x 1

**3** → Dos: 1 x 1

**4** → geb. am 25.07.83

**E-Rezept**

**345678900**

### Rezeptangaben:

- 1 Geschlecht:** Für Frauen im gebärfähigen Alter gelten besondere Bestimmungen:
  - » Schwangerschaftsverhütungsprogramm
  - » Schwangerschaft ist eine Kontraindikation.
- 2 Ausstellungs- und Abgabedatum:** Die Abgabe muss innerhalb von sechs Tagen nach dem Ausstellungsdatum erfolgt sein (gilt bei Verordnungen für Frauen im gebärfähigen Alter).<sup>1</sup>
- 3 Rezeptierte Gesamtmenge:** Isotretinoin darf nur für eine Behandlungsdauer von insgesamt 30 Tagen verordnet werden, damit eine regelmäßige ärztliche Betreuung gewährleistet ist (gilt bei Verordnungen für Frauen im gebärfähigen Alter).<sup>2</sup>
- 4 Geburtsdatum kontrollieren:** Für Kinder unter 12 Jahren wird die Einnahme von isotretinoinhaltigen Arzneimitteln nicht empfohlen.

### ! WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE BERATUNG:

- » Sonnenlicht und UV-Strahlen meiden, ggf. Sonnenschutz empfehlen
- » Vorsicht beim Führen eines Fahrzeugs und Bedienen von Maschinen (mögl. Verminderung des Nachtsehens)
- » Keine Blutspende während und bis zu einen Monat nach Ende der Behandlung
- » In seltenen Fällen wurde über Depressionen oder über durch Depressionen verstärkte Angststörungen und über Stimmungsschwankungen unter der Einnahme oraler Retinoide berichtet.
- » Die Patientin muss mindestens einen Monat vor Beginn, während und einen Monat nach Ende der Behandlung ununterbrochen wirksame Verhütungsmethoden anwenden.
- » Arzneimittel sicher aufbewahren und nicht an andere Personen weitergeben
- » Übrig gebliebene Kapseln zur Entsorgung in die Apotheke zurückbringen
- » Vitamin A als Nahrungsergänzung vermeiden
- » Wechselwirkungen beachten: z. B. mit Tetracyclinen

<sup>1</sup> Lt. Schwangerschaftsverhütungsprogramm (Leitfaden für Ärztin und Arzt bzw. Apotheke) i. V. m. § 3b AMVV <sup>2</sup> Wenn die Behandlungsdauer bzw. Dosierung nicht bekannt ist, sollte eine ärztliche Rücksprache erfolgen.

## Umgang mit Acitretin-Verordnungen (Diese Vorgaben gelten auch für Alitretinoin-Verordnungen)

### Rezeptangaben:

- 1 Geschlecht:** Für Frauen im gebärfähigen Alter gelten besondere Bestimmungen:
  - » Schwangerschaftsverhütungsprogramm
  - » Schwangerschaft ist eine Kontraindikation.
  
- 2 Ausstellungs- und Abgabedatum:** Die Abgabe muss innerhalb von sechs Tagen nach dem Ausstellungsdatum erfolgt sein (gilt bei Verordnungen für Frauen im gebärfähigen Alter).<sup>1</sup>
  
- 3 Rezeptierte Gesamtmenge:** Acitretin darf nur für eine Behandlungsdauer von insgesamt 30 Tagen verordnet werden, damit eine regelmäßige ärztliche Betreuung gewährleistet ist (gilt bei Verordnungen für Frauen im gebärfähigen Alter).<sup>2</sup>

**1** → Name, Vorname des Versicherten: **Astrid**

**2** → Datum: **01.07.83**

**3** → Dos: **1 x 1**

**E-Rezept**

345678900

### ⚠ WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE BERATUNG:

- » Sonnenlicht und UV-Strahlen meiden, ggf. Sonnenschutz empfehlen
- » Absolutes Alkoholverbot für Patientinnen im gebärfähigen Alter während der Behandlung und 2 Monate nach Behandlungsende
- » Keine Blutspende während der Behandlung und 3 Jahre nach Behandlungsende
- » In seltenen Fällen wurde über Depressionen oder über durch Depressionen verstärkte Angststörungen und über Stimmungsschwankungen unter der Einnahme oraler Retinoide berichtet.
- » Die Patientin muss mindestens einen Monat vor Beginn der Behandlung, während und bis zu 3 Jahre nach Therapieende wirksame Verhütungsmethoden anwenden.
- » Arzneimittel sicher aufbewahren und nicht an andere Personen weitergeben
- » Übrig gebliebene Kapseln zur Entsorgung in die Apotheke zurückbringen
- » Vitamin A als Nahrungsergänzung vermeiden
- » Wechselwirkungen beachten: z. B. mit Desogestrel, Levonorgestrel, Methotrexat, Tetracyclinen

<sup>1</sup> Lt. Schwangerschaftsverhütungsprogramm (Leitfaden für Ärztin und Arzt bzw. Apotheke) i. V. m. § 3b AMVV    <sup>2</sup> Wenn die Behandlungsdauer bzw. Dosierung nicht bekannt ist, sollte eine ärztliche Rücksprache erfolgen.