


## Erstattungsfähigkeit von Laxantien\*

Bei der Abgabe von Laxantien auf einem Kassenrezept ist zunächst zu überprüfen, ob die Gesetzliche Krankenversicherung das verordnete Präparat erstattet. Das folgende Fließschema unterstützt Sie bei der richtigen Rezeptbelieferung.



\* Nicht erstattungsfähig sind Jumbopackungen; die Abgabe mehrerer Packungen ist gesondert zu überprüfen.

## Laxantien von ratiopharm im Überblick

Produkt	Macrogol-ratiopharm® flüssig Orange <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Neu</span>	Macrogol-ratiopharm® Balance	Laxans-ratiopharm® 7,5 mg Pico-Tropfen	Laxans-ratiopharm® 5 mg magensaftresistente Tabletten	Laxans-ratiopharm® 10 mg Zäpfchen	Lactulose-ratiopharm® Sirup
Wirkstoff	Macrogol 3350, Elektrolyte (NaCl, NaHCO <sub>3</sub> , KCl)	Macrogol 3350, Elektrolyte (NaCl, NaHCO <sub>3</sub> , KCl)	Natriumpicosulfat	Bisacodyl	Bisacodyl	Lactulose
Darreichungsform	Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen	Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen	Pico-Tropfen zum Einnehmen	Magensaftresistente Tabletten	Zäpfchen	Sirup
Status	Medizinprodukt	Apothekenpflichtiges Arzneimittel	Apothekenpflichtiges Arzneimittel	Apothekenpflichtiges Arzneimittel	Apothekenpflichtiges Arzneimittel	Apothekenpflichtiges Arzneimittel
Erstattungsfähig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indikation	Zur Behandlung von akuter und chronischer Verstopfung	Zur Behandlung von chronischer Verstopfung	Zur Behandlung von Verstopfung	Zur Behandlung von Verstopfung	Zur Behandlung von Verstopfung	Verstopfung, Portokavale Enzephalopathie
Wirkweise	Macrogol bindet eingenommenes Wasser und transportiert dieses in den Dickdarm, wodurch fester Stuhl erweicht und das Stuhlvolumen erhöht wird. Dies regt die Darmbewegung an. Da Macrogol mit dem Stuhl ausgeschieden wird, belastet es den Organismus nicht.	Macrogol bindet eingenommenes Wasser und transportiert dieses in den Dickdarm, wodurch fester Stuhl erweicht und das Stuhlvolumen erhöht wird. Dies regt die Darmbewegung an. Da Macrogol mit dem Stuhl ausgeschieden wird, belastet es den Organismus nicht.	Natriumpicosulfat regt die Darmbewegung an und fördert die Ansammlung von Wasser und Elektrolyten im Darm.	Bisacodyl regt die Darmbewegung an und fördert die Ansammlung von Wasser und Elektrolyten im Darm.	Bisacodyl regt die Darmbewegung an und fördert die Ansammlung von Wasser und Elektrolyten im Darm.	Lactulose wird im Dickdarm von Bakterien zu Milchsäure und anderen kurzkettigen Fettsäuren verstoffwechselt, wodurch die Darmbewegung angeregt wird.
Anwendungsdauer	I. d. R. nicht länger als zwei Wochen, kann aber längerfristig erfolgen	I. d. R. nicht länger als zwei Wochen, kann aber längerfristig erfolgen	Ohne differentialdiagnostische Abklärung der Verstopfungsursache nicht täglich oder über einen längeren Zeitraum	Ohne differentialdiagnostische Abklärung der Verstopfungsursache nicht täglich oder über einen längeren Zeitraum	Ohne differentialdiagnostische Abklärung der Verstopfungsursache nicht täglich oder über einen längeren Zeitraum	Richtet sich nach der Entwicklung des Krankheitsbildes
Für wen geeignet	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre	Erwachsene und Kinder ab 4 Jahre	Erwachsene und Kinder ab 2 Jahre; < 10 Jahre nur auf ärztliche Anweisung	Erwachsene und Kinder ab 10 Jahre	Erwachsene und Kinder
Kundentipp/Besonderheit	Laktose- und konservierungsmittelfrei	Laktosefrei	YouTube-Anwendungsvideo: <a href="http://www.otcdialog.de/3961">www.otcdialog.de/3961</a>			
Wirkeintritt	1–3 Tage	1–3 Tage	Nach ca. 10–12 Stunden	Nach ca. 6–12 Stunden	Nach ca. 15–30 Minuten	Nach 2–3 Std., bei ungenügender Dosis bis 48 Std.