

Übersicht: Zubehör für COVID-19-Impfungen

Rekonstitution: Mengenangaben in Klammer, immer +10 % Puffer

Einmalspritzen		
2 ml, alternativ bei Nichtverfügbarkeit 3 ml oder 5 ml	z. B.: INJEKT Solo Spritze 2 ml Luer zentrisch PVC-frei (PZN: 02057895) BD Discardit II Spritze 2 ml (PZN: 03626800)	▶ Comirnaty JN.1 3 µg/Dosis Konzentrat zur Herstellung einer Injektionsdispersion für Kinder ab 6 Monaten bis 4 Jahre (1) ▶ Comirnaty KP.2 3 µg/Dosis Konzentrat zur Herstellung einer Injektionsdispersion für Kinder ab 6 Monaten bis 4 Jahre (1)
Standardkanülen: ≥ 21G, (≤ 0,8) x 40 mm	z. B.: STERICAN Kanülen Luer-Lok 0,80 x 40 mm Gr. 2 grün (PZN: 02050806), BD Microlance Kanüle 21G 1 ½ 0,8 x 40 mm (PZN: 03086930) (1)	
NaCl 0,9 % Ampulle 2 ml (Alternative: 5 ml, 10 ml)	z. B.: ISOTONE NaCl-Lösung ASmedic Injektionslsg. Amp. (PZN: 17388669) (1)	

Applikation: Mengenangaben in Klammer, immer +10 % Puffer

Feindosierspritze		
1 ml (Spritze + Nadel Totvolumen ≤ 35 µl)	z. B.: INJEKT F Feindosierungsspr. 1 ml o. Kan. (PZN: 00896456) OMNIFIX F Solo Spr. 1 ml (PZN: 00569881) BD Plastipak Tuberkulinspritze 1 ml o. Kan. (PZN: 07250415)	▶ Comirnaty JN.1 30 µg/Dosis (6) ▶ Comirnaty JN.1 10 µg/Dosis Injektionsdispersion für Kinder ab 5 bis 11 Jahre (6) ▶ Comirnaty JN.1 3 µg/Dosis Konzentrat zur Herstellung einer Injektionsdispersion für Kinder ab 6 Monaten bis 4 Jahre (3)* ▶ Comirnaty KP.2 30 µg/Dosis (6) ▶ Comirnaty KP.2 10 µg/Dosis Injektionsdispersion für Kinder ab 5 bis 11 Jahre (6) ▶ Comirnaty KP.2 3 µg/Dosis Konzentrat zur Herstellung einer Injektionsdispersion für Kinder ab 6 Monaten bis 4 Jahre (3)*
Kanülen		
25G, 0,50 x 25 mm; alt. 22–24G (für i.m. Injektion zugelassen)	z. B.: BD MICROLANCE Kanüle 25G 1 0,5 x 25 mm (PZN: 03086982) STERICAN Dentalkan.Luer 0,5 x 25 mm (PZN: 02057990)	▶ Comirnaty JN.1 30 µg/Dosis (6) ▶ Comirnaty JN.1 10 µg/Dosis Injektionsdispersion für Kinder ab 5 bis 11 Jahre (6) ▶ Comirnaty JN.1 3 µg/Dosis Konzentrat zur Herstellung einer Injektionsdispersion für Kinder ab 6 Monaten bis 4 Jahre (3)* ▶ Comirnaty KP.2 30 µg/Dosis (6) ▶ Comirnaty KP.2 10 µg/Dosis Injektionsdispersion für Kinder ab 5 bis 11 Jahre (6) ▶ Comirnaty KP.2 3 µg/Dosis Konzentrat zur Herstellung einer Injektionsdispersion für Kinder ab 6 Monaten bis 4 Jahren (3)*

* Für das Aufziehen von 3 Dosen aus einem Vial ist die Verwendung einer Spritzen-Kanülen-Kombination mit einem Totvolumen von ≤ 35 µl nicht unbedingt erforderlich.