

DicloSpray 40 mg/g Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung

Wirkstoff:

- Diclofenac-Natrium

Anwendungsgebiet:

- Zur lokalen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen und Entzündung in Folge akuter stumpfer Traumen kleiner und mittelgroßer Gelenke sowie periartikulärer Strukturen

Darreichungsform und Packungsgrößen:

- 25 g Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung; PZN 17856099

Dosierung:

- Erwachsene 3 x täglich je nach Größe der schmerzenden Stelle jeweils bis zu 5 Sprühstöße auftragen, max. 15 Sprühstöße/Tag

Anwendung:

- Spray leicht in die Haut einmassieren und eventuelle Rückstände von den Händen abwaschen

Hinweis:

- Nach der Anwendung gegebenenfalls trocknen lassen
- Anwendung nach Abklingen der Symptome beenden
- Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet
- Nicht länger als 7 Tage ohne ärztliche Kontrolle anwenden



Gut zu wissen:

- ▶ Einfach anzuwenden, exakte Dosierung durch Sprühstoß
- ▶ Angenehme Anwendung auf der Haut, trocknet schnell
- ▶ Optimal geeignet für unterwegs
- ▶ Hohe Wirkstoffkonzentration im Spray mit 40 mg/g
- ▶ Mizellen als Vehikelsystem sorgen für schnelle Penetration des Wirkstoffs in die Haut.

Diclo Spray

Jederzeit. Griffbereit.

DAS Schmerzspray*

- Jederzeit griffbereit – ideal für unterwegs
- Einfach in der Anwendung – gezielt aufgetragen und exakt dosiert
- Schnell und unkompliziert – zieht direkt ein, ohne lästige Rückstände

*Zur lokalen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen und Entzündung in Folge akuter stumpfer Traumen kleiner und mittelgroßer Gelenke sowie umliegender Strukturen



Abbildung ähnlich

DicloSpray 40 mg/g Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung. Wirkst.: Diclofenac-Natrium. **Zus.:** Jedes Gramm der Lösung enthält 40 mg Diclofenac-Natrium. **Sonst. Bestandt.:** 2-Propanol (Ph.Eur.), Phospholipide aus Sojabohnen (E322), Ethanol, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (Ph.Eur.), Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumedetat (Ph.Eur.), Propylenglycol (E1520), Pfefferminzöl, Palmitoylascorbinsäure (Ph.Eur.), Salzsäure 10 % (zur Einstellung des pH-Werts), Natriumhydroxid-Lösung 10 % (zur Einstellung des pH-Werts), Gereinigtes Wasser. **Anw.:** Zur lokalen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen und Entzündung in Folge akuter stumpfer Traumen kleiner und mittelgroßer Gelenke sowie periartikulärer Strukturen. **Gegenanz.:** Überempf. gegen Diclofenac, Erdnüsse, Soja oder einen der sonst. Bestandteile. Überempf. gegen Acetylsalicylsäure oder andere nicht-steroidale Antirheumatika /Antiphlogistika (NSAR). Patienten, bei denen in der Vergangenheit Asthmaanfälle, Urtikaria oder akute Rhinitis nach Anwendung von Acetylsalicylsäure oder anderen nicht-steroidalen Antirheumatika/Antiphlogistika (NSAR) aufgetreten sind. Anwendung auf offenen Verletzungen, entzündeter oder infizierter Haut sowie auf Ekzemen oder Schleimhäuten. Während der letzten drei Schwangerschaftsmonate. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren. **Nebenw.:** Häufig: Hautausschlag, Ekzem, Erythem, Dermatitis (einschließlich Kontaktdermatitis), Juckreiz; Selt.: Dermatitis bullosa; Sehr selt.: Pustulöser Hautauschlag, Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Urtikaria), Angioödem, Asthma, Lichtempfindlichkeitsreaktionen; Nicht bekannt: Reaktionen an der Applikationsstelle, Hauttrockenheit, Brennen. Wenn DicloSpray großflächig auf der Haut und über einen längeren Zeitraum angewendet wird, kann das Auftreten von systemischen Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen werden. Reaktionen wie z. B. Bauchschmerzen, Dyspepsie, Magen-, Leber- oder Nierenbeschwerden und systemische Überempfindlichkeitsreaktionen können auftreten. **Warnhinw.:** Enthält Propylenglycol (E1520), Pfefferminzöl und Phospholipide aus Sojabohnen (E322). **Apothekenpflichtig. Stand:** 06/2021. SANAVITA Pharmaceuticals GmbH, Spaldingstr. 110 B, 20097 Hamburg, Deutschland.

SANAVITA

SANAVITA Pharmaceuticals GmbH . Spaldingstraße 110 B . 20097 Hamburg . www.diclopray.de



AN-2DD-DICLF-DE-00