

Wirkstoff:

Eine Kapsel enthält folgende Rizoenzyme:

- Rizolipase aus *Rhizopus oryzae* entspr. 7.000 FIP-E.
- Protease aus *Aspergillus oryzae* mind. 54 FIP-E.
- Amylase aus *Aspergillus oryzae* mind. 700 FIP-E.

Anwendungsgebiet:

- Zum Ersatz von Verdauungsenzymen bei Maldigestion (Verdauungsschwäche) infolge einer gestörten Funktion der Bauchspeicheldrüse

Packungsgröße und Darreichungsform:

- Kapseln zum Einnehmen: 20 St., 50 St. (N1), 100 St. (N2), 200 St. (N3)

Dosierungsempfehlung:

- Leichte bis mäßige Beschwerden / Leichte bis mittelschwere exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI): 2–3 Kapseln zu jeder Hauptmahlzeit
- Starke Beschwerden / Schwere EPI: 3 Kapseln zu jeder Hauptmahlzeit
- Fettarme Zwischenmahlzeiten / Milchhaltige Getränke: 1 Kapsel

Hinweise:

- Die Kapseleinnahme erfolgt unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit verteilt über eine Mahlzeit.
- Die Dosis sollte individuell basierend auf der Schwere der Erkrankung angepasst werden. Unterstützend dazu sind Enzymtagebücher hilfreich.



NORTASE® – gut zu wissen

- ▶ **Effektive Linderung typischer Verdauungsbeschwerden** wie stinkende Blähungen, Völlegefühl, weiche Stühle bis hin zu Durchfall
- ▶ Bei Bauchspeicheldrüsenschwäche nach fettigen/deftigen Mahlzeiten
- ▶ Säurestabile Rizoenzyme: Wirkeintritt bereits im Magen, wo fettreiche Nahrung meist länger verweilt
- ▶ Kleine, gut zu schluckende Kapsel
- ▶ Geeignet für Schwangere, Stillende, Vegetarier und Muslime
- ▶ **NORTASE® gibt dem Körper, was ihm für eine funktionierende Verdauung fehlt und setzt damit an der Ursache der Verdauungsbeschwerden infolge einer Bauchspeicheldrüsenschwäche an.**



- ▶ **Vegetarische Verdauungsenzyme bei Bauchspeicheldrüsenschwäche**
- ▶ **Linderung von Verdauungsbeschwerden nach den Mahlzeiten, die durch fehlende Enzyme entstehen (Blähungen, Bauchschmerzen, weiche Stühle)**

NORTASE®



NORTASE® Anwendungsgebiete: Störungen der exokrinen Pankreasfunktion, die mit einer Maldigestion einhergehen. **Zusammensetzung:** 1 Kapsel enthält: Rizolipase (Lipase aus *Rhizopus oryzae*) entspr. 7000 FIP-E., Protease aus *Aspergillus oryzae* mind. 54 FIP-E., Amylase aus *Aspergillus oryzae* mind. 700 FIP-E.. Sonstige Bestandteile: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Farbstoffe: Titandioxid E 171, Eisen(III)-oxid E 172. Enthält Lactose. **Gegenanzeigen:** Akute Pankreatitis, akuter Schub einer chronischen Pankreatitis, bekannte Überempfindlichkeit gegen Schimmelpilze (Schimmelpilzallergie) oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Selten: unspezifische Begleiterscheinungen wie Diarrhoe, Übelkeit, Obstipation und Oberbauchbeschwerden sowie allergisch bedingte Atem- und Hautreaktionen nach berufsbedingter Sensibilisierung mit Schimmelpilzenzymen. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Repha GmbH Biologische Arzneimittel, Alt-Godshorn 87, 30855 Langenhagen. Stand 03/21