

صحة الرجل مع هورموسان

حضرة المريض المحترم،

الضعف الجنسي من المشاكل التي لا يحيد الكثير من الرجال المعنيين بها التحدث عنها. الخبر الجيد هو أن: المرض قابل للعلاج. حصلت في الصيدلية على منتج يحتوي على المادة الفعالة سيلدينافيل من شركة هورموسان. تحصل فيما يلي على لمحة قصيرة عن كيفية تناول الدواء بشكل صحيح وكذلك معلومات عن آلية تأثيره وعن مدة العلاج.

الضعف الجنسي

يمثل العلاج الدوائي نوع العلاج الأكثر استخدامًا للضعف الجنسي ويتكون في أغلب الأحيان من تناول مثبطات الفوسفوديستيراز (PDE). وهي تعمل بنفس الآلية، ولكنها تختلف من حيث مواصفات الحركة الدوائية الخاصة بها، مثل بدء التأثير ومدة التأثير.

معلومة مهمة: لا يعمل سيلدينافيل إلا في حالة الإثارة الجنسية.

المنتج	
سيلدينافيل-هورموسان 50 ملغ/100 ملغ قرص مغلف	
	
تناول الأقراص الجرعة الموصى بها	قبل حوالي 30-60 دقيقة من النشاط الجنسي تبلغ الجرعة الموصى بها 50 ملغ. وقد تتراوح الجرعة الفعلية بين 25 ملغ و 100 ملغ. لا تتناول سوى الجرعة التي يوصي بها الطبيب!
تعديل الجرعة	يمكن تعديل الجرعة بالتقسيم*
عدد مرات الاستخدام	لا يستخدم أكثر من مرة واحدة في اليوم
يبدأ المفعول بعد	30 إلى 60 دقيقة
يمكن ممارسة الاتصال الجنسية في غضون	4 حتى 6 ساعات
تأثير الوجبة	قد يؤخر تناول وجبة غذائية دسمة في نفس الوقت ظهور المفعول.
موانع الاستعمال#	أمراض القلب والشرابيين الخطيرة أو اضطرابات وظائف الكبد الخطيرة أو انخفاض ضغط الدم أو سكتة دماغية أو نوبة قلبية حديثة أو مرض الشبكية التنكسية أو الدمج مع النترات أو الموسعات الوعائية النترية أو مثبطات الأنزيم البروتيني لفيروس نقص المناعة البشرية
الآثار الجانبية#	صداع (كثيرة للغاية)، دوخة (كثيرة)، احمرار الجلد (كثيرة)، عسر الهضم (كثيرة)، انسداد الأنف (كثيرة)، اضطرابات الرؤية (كثيرة)
بماذا يوصى أيضًا	<ul style="list-style-type: none"> • من يُدخن عليه التوقف عن التدخين. في كثير من الأحيان يختفي ضعف الانتصاب دون أدوية. • إذا كان ضعف الانتصاب نتيجة للإصابة بمرض، مثل السكري أو تصلب الشرايين، فينبغي علاج المرض الأساسي حسب إرشادات العلاج، وبذلك يمكن تجنب تدهور حالة ضعف الانتصاب. • أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام قد تحسن تدفق الدم في القضيب. • إذا ظهر ضعف الانتصاب كأثر جانبي نتيجة لتناول أدوية بشكل دائم، فينبغي البحث عن بديل مع الطبيب. لا ينبغي أبداً توقيف هذه الأدوية بشكل عشوائي ودون استشارة الطبيب.

* يُسمح بتقسيم سيلدينافيل-هورموسان 50 ملغ و 100 ملغ.
يؤقتيم فرام. إ. ل: ملفات تعريف الأدوية للجيب - توصيات المشورة المتعلقة بالمادة الفعالة للرعاية الصيدلانية، الإصدار السادس، 2018، دار نشر الصيدلة الألمانية، شتوتغارت

المعلومات المفصلة متوفرة في النشرة الموجودة في العبوة.

المزيد من المعلومات توفرة على الرابط: www.maennersache-hormosan.de