

Hormosan ile erkek sađlığı


Deđerli Hasta,

Eretil disfonksiyon olarak da adlandırılan potens bozuklukları, bu durumdan muzdarip olan erkeklerin konuşmaktan pek hoşlanmadığı problemlerden biridir. Size iyi bir haberimiz var: Bu hastalık tedavi edilebilir. Eczaneden Hormosan firmasının Sildenafil etkin maddesini içeren bir ürün almış bulunmaktasınız. Aşađıda ilacın dođru alımına ilişkin kısa bir genel bakışın yanı sıra etki şekli ve etki süresi hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Potens bozuklukları

İlaç terapisi, erektil işlev bozukluğu için en yaygın tedavi şeklidir ve çođu durumda fosfodiesteraz (PDE)-5 inhibitörlerinin verilmesi ile gerçekleşir. Bunların hepsi aynı mekanizma ile çalışır, ancak etki başlangıcı ve etki süresi gibi farmakokinetik özellikleri açısından farklılık gösterir.

Önemli: Sildenafil sadece cinsel uyarım olduğunda etki edebilir.

Ürün	Sildenafil-Hormosan 50 mg / 100 mg FKT 
Alınması	Cinsel aktiviteden yakl. 30-60 dakika önce
Önerilen doz	Önerilen doz 50 mg'dır. Gerçek doz 25 mg ila 100 mg arasında olabilir. Sadece doktor tarafından önerilen dozu alınız!
Doz uyarlaması	Bölnüebilme özelliđi sayesinde doz uyarlaması mümkündür*
Kullanım sıklığı	Günde 1 kereden fazla kullanılmamalıdır
Etki başlangıcı	30-60 dakika sonra
Cinsel ilişki	4-6 saat içinde mümkündür
Öğünün etkisi	Aynı anda zengin bir öğün yemek, etkinin başlamasını geciktirebilir.
Kontrendikasyonlar#	Şiddetli kalp-damar hastalıkları, şiddetli karaciđer işlev bozukluğu, hipotansiyon, yakın zamanda inme veya kalp enfarktüsü, dejeneratif retina hastalığı, nitratlarla, NO donörleriyle veya HIV proteaz inhibitörleriyle kombinasyon
Yan etkiler# çy = çok yaygın y = yaygın	Baş ağrısı (çy), baş dönmesi (y), cilt kızarıklığı (y), disepsi (y), burun tıkanıklığı (y), görme bozukluğu (y)
Diđer öneriler	<ul style="list-style-type: none">• Sigara içen kişiler buna derhal son vermelidir. Bu durumda erektil işlev bozukluğu sıklıkla ilaç kullanılmaksızın da ortadan kaybolur.• Eretil işlev bozukluğu diyabet veya arterioskleroz gibi bir hastalığa dayanıyorsa altta yatan hastalık terapi kılavuzları uyarınca tedavi edilmelidir, bu sayede erektil işlev bozukluđunun kötüleşmesi önlenebilir.• Araştırmalar, düzenli egzersizin penisin kan sirkülasyonunu iyileştirebileceđini göstermiştir.• Eretil işlev bozukluğu uzun süreli ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkıyorsa doktorla birlikte bir alternatif aranmalıdır. Bu tür ilaçlar kesinlikle bir doktora danışılmadan kendi başına kesilmemelidir.

* Sildenafil-Hormosan 50 mg ve 100 mg bölünme için onaylanmıştır.
Joachim Framm ve diđerleri: Arzneimittelprofile für die Kitteltasche - Wirkstoffbezogene Beratungsempfehlungen für die Pharmazeutische Betreuung, 6. baskı, 2018, Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart

Ayrıntılı bilgi için prospektüse bakılmalıdır.

Daha fazla bilgi için: www.maennersache-hormosan.de