

## صحة الرجل مع هورموسان

## حضره المريض المحترم،

الضعف الجنسي من المشاكل التي لا يحبذ الرجال المعنيين بها التحدث عنها. الخبر الجيد هو أن: المرض قابل للعلاج. حصلت في الصيدلية على منتج يحتوي على المادة الفعالة تادالافيل من شركة هورموسان. تحصل فيما يلي على لمحة قصيرة عن كيفية تناول الدواء بشكل صحيح وكذلك معلومات عن آلية تأثيره وعن مدة العلاج.

## الضعف الجنسي

يمثل العلاج الدوائي نوع العلاج الأكثر استخدامًا للضعف الجنسي ويتكون في أغلب الأحيان من تناول مثبطات الفوسفوديستيراز (PDE). وهي تعمل بنفس الآلية، ولكنها تختلف من حيث مواصفات الحركة الدوائية الخاصة بها، مثل بدء التأثير ومدة التأثير.

معلومة مهمة: لا يعمل تادالافيل إلا في حالة الإثارة الجنسية.

المنتج	تادالافيل-هورموسان 5 ملغ/10 ملغ/20 ملغ قرص مغلف
تناول الأقراص	على الأقل 30 دقيقة قبل النشاط الجنسي
الجرعة الموصى بها*	الجرعة الموصى بها في العلاج عند الحاجة هي 10 ملغ ويمكن زيادتها إلى 20 ملغ. بالنسبة للمرضى الذي يتوقعون استخدامًا متكررًا لمادة تادالافيل (مثلًا مرتين في الأسبوع)، فيمكن استخدام 5 ملغ من تادالافيل في كل مرة يوميًا في نفس الوقت.
تعديل الجرعة	لا تتناول سوى الجرعة التي يوصى بها الطبيب!
عدد مرات الاستخدام*	—
يبدأ المفعول بعد	16 إلى 30 دقيقة
يمكن ممارسة الاتصال الجنسية في غضون	24 حتى 36 ساعات
تأثير الوجبة	يمكن تناوله دون الارتباط بوجبة معينة.
موانع الاستعمال#	أمراض القلب والشرابين الخطيرة، انخفاض ضغط الدم، عدم انتظام ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم، سكتة دماغية أو نوبة قلبية حديثة، أو الموسعات الوعائية النترية
الأثار الجانبية#	صداع (كثيرة للغاية)، دوخة (كثيرة)، احمرار الجلد (كثيرة)، عسر الهضم (كثيرة)، انسداد الأنف (كثيرة)، ألم العضلات (كثيرة)
بماذا يوصى أيضًا	<ul style="list-style-type: none"> <li>من يُدخن عليه التوقف عن التدخين. في كثير من الأحيان يخفّي ضعف الانتصاب دون أدوية أيضًا.</li> <li>إذا كان ضعف الانتصاب نتيجة للإصابة بمرض، مثل السكري أو تصلب الشرايين، فينبغي علاج المرض الأساسي بشكل مركز، وبذلك يمكن تجنب تدهور حالة ضعف الانتصاب.</li> <li>أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام قد تحسن تدفق الدم في القضيب.</li> <li>إذا ظهر ضعف الانتصاب كأثر جانبي نتيجة لتناول أدوية بشكل دائم، فينبغي البحث عن بديل مع الطبيب. لا ينبغي أبدًا توقيف هذه الأدوية من تلقاء نفسك ودون استشارة الطبيب.</li> </ul>

\* يمكن استخدام تادالافيل 5 ملغ أيضًا لعلاج تضخم البروستاتا الحميد. معلومة حول الجرعة والاستخدام متاحة في النشرة المرفقة بالعبوة.  
#المعلومات المفصلة متوفرة في النشرة المرفقة بالعبوة.

المزيد من المعلومات متوفرة على الرابط: [www.mannersache-hormosan.de](http://www.mannersache-hormosan.de)