

Мужское здоровье с HORMOSAN

Уважаемый пациент!

Проблемы с потенцией — это то, о чем мужчины говорят неохотно. У нас есть хорошая новость: эта болезнь излечима. Вы приобрели в аптеке продукт компании HORMOSAN с действующим веществом тадалафил*. Далее мы кратко расскажем Вам, как правильно принимать его, а также о принципе действия и длительности терапии.

Проблемы с потенцией

Медикаментозная терапия является самым распространенным вариантом лечения эректильной дисфункции. Чаще всего она представляет собой прием ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5). Все они имеют одинаковый механизм воздействия, но отличаются по своим фармакокинетическими свойствами, таким как скорость наступления эффекта и его длительность.

Важно: Тадалафил действует только при наличии сексуального возбуждения.

Продукт	<p>Тадалафил Hormosan 5 мг / 10 мг / 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>
Прием	Не менее чем за 30 минут до сексуальной активности
Рекомендованная дозировка*	При применении по потребности рекомендованная доза составляет 10 мг и может быть увеличена до 20 мг. Если ожидается более частое принятие Тадалифила (не менее 2 раз в неделю), возможен ежедневный прием 5 мг Тадалифила в одно и то же время.
Принимайте препарат только в рекомендованной врачом дозировке!	
Изменение дозировки	—
Частота применения*	Применять не чаще 1 раза в сутки
Наступление эффекта через	16–30 минут
Половой акт возможен в течение	24–36 часов
Влияние приемов пищи	Независимо от приема пищи.
Противопоказания[#]	Тяжелые заболевания сердца и нарушения кровообращения, гипотония, неконтролируемая аритмия и гипертония, недавно перенесенный инсульт или инфаркт, сочетание с нитратами или нитровазодилаторами.
Побочные эффекты[#] оч = очень часто ч = часто	Головные боли (оч), головокружение (ч), покраснение кожи (ч), диспепсия (ч), заложенность носа (ч), боли в мускулах (ч)
Дополнительные рекомендации	<ul style="list-style-type: none"> • Курильщикам следует в обязательном порядке отказаться от курения. Часто после этого эректильная дисфункция проходит сама, без приема медикаментов. • Если причиной эректильной дисфункции может являться заболевание, например, диабет или атеросклероз, следует интенсивно лечить основное заболевание, чтобы избежать ухудшения эректильной дисфункции. • Согласно исследованиям, регулярные занятия спортом улучшают кровоснабжение пениса. • Если эректильная дисфункция является побочным эффектом длительно принимаемых медицинских препаратов, следует совместно с врачом подобрать альтернативу. Ни в коем случае не прекращайте прием такого препарата самостоятельно, без консультации с врачом.

* Тадалафил 5 мг также может применяться для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Информацию о дозировке и применении Вы найдете в инструкции.

[#] Подробную информацию Вы найдете в инструкции по применению.

Больше информации на сайте: www.maennersache-hormosan.de