Beratungsbogen/Dokumentation für die Durchführung der pharmazeutischen Dienstleistung

„Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Üben der Inhalationstechnik“ für ein Dosieraerosol nach Vorlage einer gültigen Verordnung

_____ _____

Ort, Datum Patient

Inhaltsstoffe:

Aforbe®: Beclometason 100 µg + Formoterol 6 µg

Aufforderung des Patienten, die Arzneimittelinhalation wie gewohnt durchzuführen, Beobachtungen notieren und anschließend mit dem Patienten besprechen.

	Beobachtung	Beratungsbedarf
Zustand des Dosieraerosols (Inhalationsgerät):		
• Technisch funktionsfähig		
• Ausreichend sauber		
Vorbereitung der Inhalation:		
• Schutzkappe auf dem Mundstück durch leichtes Zusammendrücken auf der Seite und Abziehen nach vorne entfernen.		
• Den Inhalator einschließlich des Mundrohres innen und außen auf das Vorhandensein von losen Fremdkörpern überprüfen.		
Inhalieren:		
• Die Inhalation sollte im Sitzen oder Stehen erfolgen.		
• Inhalator zwischen Fingern und Daumen mit dem Daumen unter dem Mundstück aufrecht halten.		
• So langsam und tief wie möglich ausatmen.		
• Das Mundrohr mit den Lippen fest umschließen (nicht darauf beißen).		
• Sofort nachdem der Patient beginnt, durch den Mund einzuatmen, soll der Wirkstoffbehälter fest nach unten gedrückt werden, um das Arzneimittel freizusetzen, während der Patient gleichzeitig weiterhin gleichmäßig und tief einatmet.		
• Mundstück absetzen und so lange wie möglich (mind. 5–10 Sekunden) den Atem anhalten, dann langsam ausatmen (nicht in den Inhalator).		
• Vor einer zweiten Inhalation (je nach Dosierungsvorgabe) eine halbe Minute den Inhalator aufrecht halten.		
• Nach der Inhalation Schutzkappe auf das Mundstück setzen.		

Fortsetzung ▶

	Beobachtung	Beratungsbedarf
Zählerstand:		
Weiß der Patient, dass das Zählwerk in 20er-Schritten zählt und bei „20“ die Farbe der Anzeige von Weiß zu Rot wechselt?		
Bei Zählerstand „020“ sollte zur Weiterversorgung ein Arzt aufgesucht werden.		
Reinigung:		
Wie oft reinigt der Patient den Inhalator? (Empfohlen ist mind. 1-mal/Woche.)		
Das Mundstück und das Mundrohr innen und außen mit einem trockenen Tuch abwischen. KEIN WASSER!		
Lagerung:		
Bis zum ersten Gebrauch im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren. Sobald ein Behältnis zur Behandlung geöffnet wurde, kann es bei Raumtemperatur (25 °C) gelagert werden. Nach Anbruch max. 3 Monate verwenden. Keine direkte Sonnenbestrahlung zulassen.		
Inhalierhilfen:		
Nutzt der Patient eine Inhalationshilfe? (Nur die Inhalationshilfe AeroChamber Plus darf zusammen mit Aforbe® angewendet werden.)		
Sonstiges:		

Mit freundlicher Unterstützung von VIATRIS

© DAP Networks GmbH / ohne Gewähr / Stand: April 2025
9100002043