

Beratungsbogen/Dokumentation
für die Durchführung der pharmazeutischen Dienstleistung
„Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung
mit Üben der Inhalationstechnik“ für ein Dosieraerosol
nach Vorlage einer gültigen Verordnung

Ort, Datum

Patient

Inhaltsstoffe:

Aforbe®: Beclometason 100 µg + Formoterol 6 µg



Aufforderung des Patienten, die Arzneimittelinhalation wie gewohnt durchzuführen, Beobachtungen notieren und anschließend mit dem Patienten besprechen.

	Beobachtung	Beratungsbedarf
Zustand des Dosieraerosols (Inhalationsgerät):		
• Technisch funktionsfähig		
• Ausreichend sauber		
Vorbereitung der Inhalation:		
• Schutzkappe auf dem Mundstück durch leichtes Zusammendrücken auf der Seite und Abziehen nach vorne entfernen.		
• Den Inhalator einschließlich des Mundrohres innen und außen auf das Vorhandensein von losen Fremdkörpern überprüfen.		
Inhalieren:		
• Die Inhalation sollte im Sitzen oder Stehen erfolgen.		
• Inhalator zwischen Fingern und Daumen mit dem Daumen unter dem Mundstück aufrecht halten.		
• So langsam und tief wie möglich ausatmen.		
• Das Mundrohr mit den Lippen fest umschließen (nicht darauf beißen).		
• Sofort nachdem der Patient beginnt, durch den Mund einzusatmen, soll der Wirkstoffbehälter fest nach unten gedrückt werden, um das Arzneimittel freizusetzen, während der Patient gleichzeitig weiterhin gleichmäßig und tief einatmet.		
• Mundstück absetzen und so lange wie möglich (mind. 5–10 Sekunden) den Atem anhalten, dann langsam ausatmen (nicht in den Inhalator).		
• Vor einer zweiten Inhalation (je nach Dosierungsvorgabe) eine halbe Minute den Inhalator aufrecht halten.		
• Nach der Inhalation Schutzkappe auf das Mundstück setzen.		

	Beobachtung	Beratungsbedarf
Zählerstand:		
Weiß der Patient, dass das Zählwerk in 20er Schritten zählt und bei „20“ die Farbe der Anzeige von weiß zu rot wechselt?		
Bei Zählerstand „020“ sollte zur Weiterversorgung ein Arzt aufgesucht werden.		
Reinigung:		
Wie oft reinigt der Patient den Inhalator? (Empfohlen ist mind. 1-mal/Woche.)		
Das Mundstück und das Mundrohr innen und außen mit einem trockenen Tuch abwischen. KEIN WASSER!		
Lagerung:		
Bis zum ersten Gebrauch im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren. Sobald ein Behältnis zur Behandlung geöffnet wurde, kann es bei Raumtemperatur (25 °C) gelagert werden. Nach Anbruch max. 3 Monate verwenden. Keine direkte Sonnenbestrahlung zulassen.		
Inhalierhilfen:		
Nutzt der Patient eine Inhalationshilfe? (Nur die Inhalationshilfe AeroChamber Plus darf zusammen mit Aforbe® angewendet werden.)		
Sonstiges:		