

Allergische Rhinitis/Konjunktivitis

(Auswahl)

	Allopathie Augentropfen	Allopathie Nasenspray			Allopathie Kombi ATR + NAS	Cross-Selling		
Produkt/Hersteller	Polliva® 0,5 mg/ml Augentropfen Lösung URSAPHARM 	Allergodil® akut forte 1,5 mg/ml Cooper Consumer Health 	DuoAllerg® 137 µg/50 µg pro Sprühstoß, Nasenspray GALENpharma 	MomeAllerg® 50 µg/Sprühstoß Nasenspray GALENpharma 	Vividrin® Azelastin Kombipackung 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung und 1 mg/ml Nasenspray, Lösung Bausch + Lomb 	EMSER® Nasenspülsalz EMSER® Nasendusche Uriach 	TOLERIANE Dermallergo AUGEN La Roche-Posay 	TOLERIANE Dermallergo Creme La Roche-Posay 
Packungsgröße/PZN	10 ml PZN 13748591	10 ml PZN 17510656	23 g (120 Sprühstöße) PZN 19820585	10 g (60 Sprühstöße) PZN 12409639 18 g (140 Sprühstöße) PZN 12409645	ATR: 6 ml NAS: 10 ml PZN 17585565	20 Beutel PZN 02579659 (Nasenspülsalz) 1 Stück PZN 12615385 (Nasendusche + 4 Btl. Nasenspülsalz)	20 ml PZN 17507772	40 ml PZN 17507766
Darreichungsform	ATR	NAS	NAS	NAS	Kombi: ATR + NAS	Pulver / Kombipackung + 4 Btl. Pulver	Creme	Creme
Indikation/Produktinformation	Behandlung und Vorbeugung der Symptome der saisonalen allergischen Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. Behandlung der Symptome der nicht-saisonalen allergischen Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren.	Zur symptomatischen Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis (Heuschnupfen) bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.	Zur intranasalen Anwendung bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung der mittelschweren bis schweren saisonalen Rhinitis, nach deren Erstdiagnose durch den Arzt und wenn eine Monotherapie entweder mit einem intranasalen Antihistaminikum oder einem Glukokortikoid nicht als ausreichend erachtet wird.	MomeAllerg® Nasenspray ist zur Anwendung bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis, nach deren Erstdiagnose einer saisonalen allergischen Rhinitis durch einen Arzt, bestimmt.	Zur symptomatischen Behandlung von saisonaler allergischer Rhinokonjunktivitis (z. B. Heuschnupfen in Kombination mit allergischer Bindehautentzündung) bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.	EMSER® Nasenspülsalz ist ein Medizinprodukt zur Herstellung einer isotonen Nasenspüllösung und damit zur Befeuchtung, Reinigung und Unterstützung der Funktion der Nasenschleimhaut. Die Nasendusche ist eine Applikationshilfe zur Spülung der Nasenhauptöhle mit Spüllösung.	Intensiv beruhigende Pflege für die empfindliche, sehr empfindliche und zu Allergien neigende Augenpartie. Auch bei Lidexzem geeignet. Lindert Irritationen, Juckreiz und Rötungen. Augenärztlich getestet.	Tägliche Feuchtigkeitscreme für trockene bis sehr trockene, zu Allergien neigende Haut. Stark beruhigender Wirkstoff, der die Anzeichen von Hautreizungen und Empfindlichkeit bekämpft. Getestet an allergischer Haut. Hypoallergene Formel.
Prophylaxe	✓ (saisonale allergische Konjunktivitis)				✓	✓		
Akutbehandlung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Therapiebegleitende Basispflege	Therapiebegleitende Basispflege
Wirkstoff/Inhaltsstoffe	Azelastinhydrochlorid	Azelastinhydrochlorid	Azelastinhydrochlorid, Fluticasonpropionat	Mometasonfuroat	Azelastinhydrochlorid	Mineralsalzmischung mit 5 % natürlichem Emser Salz	Sphingobioma, Niacinamid, Neurosensine, Thermalwasser aus La Roche-Posay	Sphingobioma, Neurosensine, Glycerin, Sheabutter, Thermalwasser aus La Roche-Posay
Mastzellstabilisator		✓			✓			
H ₁ -Antihistaminikum		✓	✓		✓			
Glucocorticoid			✓	✓				
Konservierungsmittelfrei		✓			✓ (nur NAS)	✓	✓	✓
Puffer	Phosphat				✓ (nur NAS)			
	Citrat	✓		✓	✓ (nur NAS)			✓
	Acetat							
Haltbarkeit nach Anbruch	12 Wochen	6 Monate	6 Monate	2 Monate	ATR: 4 Wochen, NAS: 6 Monate	Nasendusche: 100 Anwendungen	6 Monate	12 Monate
Lagerung	Nicht über 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren	Nicht über 30 °C, nicht einfrieren	Nicht über 25 °C	Gereinigt u. trocken lagern (Nasendusche)	Bei Raumtemperatur lagern	Bei Raumtemperatur lagern
Auch geeignet für:	Kontaktlinsenträger	15 Minuten nach dem Tropfen können die Linsen wieder eingesetzt werden; weiche Kontaktlinsen können verfärben.		Ja	Ja	ATR: 15 Minuten Tropfabstand, Kontakt mit weichen Kontaktlinsen vermeiden.	Ja	Ja
	Schwangere + Stillende	Siehe Fachinformation	Siehe Fachinformation	Siehe Fachinformation	Siehe Fachinformation	Siehe Fachinformation	Ja	Ja
	Kinder	Ab 4 J. saisonal / Ab 12 J. nicht saisonal	Ab 6 Jahren		Ab 6 Jahren	Ab 12 Jahren (Nasendusche)		
Arzneimittel	✓	✓	✓	✓	✓			
Verordnungsfähig					Ja, Kinder			
Besonderheiten	Wirkt antiallergisch und entzündungshemmend. Im innovativen COMOD®-System: lange Haltbarkeit dank Keimfreiheit.	Patentierter Formel mit einer Azelastin-Konzentration von 1,5 mg/ml – ein Alleinstellungsmerkmal auf dem OTC-Markt der Azelastin-Präparate. Damit wirkt es langanhaltend bis zu 24 Stunden und muss nur 1-mal tägl. angewendet werden. Lindert nachweislich signifikant nasale und okuläre Symptome. Wirkt bereits innerhalb von 15 Minuten und eignet sich damit für eine schnelle und gezielte Symptomlinderung. Sucralose beigefügt für einen angenehmen Geschmack.	Wirkt lokal antiallergisch, entzündungshemmend und abschwellend. Lindert die Beschwerden an Nase und Augen, wie z. B. eine laufende und zugeschwollene Nase, Niesen, Niesreiz, Juckreiz in Nase und Augen, tränende Augen, gereizte Augen. Nasenstück regelmäßig in lauwarmem Wasser reinigen.	Wirkt lokal antiallergisch, entzündungshemmend und abschwellend. Lindert die Beschwerden an Nase und Augen, wie z. B. eine laufende und zugeschwollene Nase, Niesen, Niesreiz, Juckreiz in Nase und Augen, tränende Augen, gereizte Augen. Nasenstück regelmäßig in lauwarmem Wasser reinigen.	Azelastin, ein Phthalazinon-Derivat, ist eine stark und langanhaltend antiallergisch wirksame Substanz mit selektiv H ₁ -antagonistischen Eigenschaften. 3-fach-Wirkmechanismus (akut (H ₁ -Blocker), mastzellstabilisierend, antientzündlich). Wirkung in nur 3–15 Minuten möglich. Wirkt bis zu 24 Stunden bei 2-mal täglicher Anwendung. ATR: 2-mal täglich 1 Tropfen pro Auge. NAS: 2-mal täglich ein Sprühstoß pro Nasenloch (keine Suspension – Schütteln nicht nötig, sofort anwendungsbereit).	Bei Allergie und zur (Erkältungs-)Prophylaxe. Befeuchtet und reinigt die trockene Nasenschleimhaut. Nasendusche: hygienisch auskochen und für die Spülmaschine geeignet. Nasenspülsalz: Dosierbeutel für isotone Lösung, zur langfristigen, regelmäßigen Anwendung geeignet (1–3-mal täglich). EMSER® Nasenspülsalz ist in Packungen mit 20, 50 und 100 Dosierbeuteln erhältlich.	Dermokosmetikum. Beruhigt in 60 Sekunden, spendet 48 Stunden Feuchtigkeit. Mildert die Empfindlichkeit überempfindlicher, zu Allergien neigender Haut und stärkt die Hautschutzbarriere. Reduziert Juckreiz, Irritationen und Rötungen. Unterstützt das Mikrobiom für gesunde Haut. Duft- und alkoholfrei. Ultrahermetischer Pumpspender.	Dermokosmetikum. Spendet sofort Feuchtigkeit und mildert Hautreizungen. Sofortige Wirksamkeit gegen Rötungen und Rückfälle. Fördert das Gleichgewicht des Hautmikrobioms. Duft- und alkoholfrei. Ultrahermetischer Pumpspender.
Weitere Informationen		www.allergodil.de 	www.galenpharma.de www.duoallerg.de 	www.galenpharma.de www.momeallerg.de 		www.emser.de 	www.laroche-posay.de 	www.laroche-posay.de 

ZUSATZTIPPS:^{1,2}

- **Stoßlüften** möglichst früh (vor allem in der Stadt) oder spät (insbesondere auf dem Land); dauerhaftes Lüften sollte vermieden werden.
- **Kleidung** regelmäßig wechseln und möglichst sofort waschen.
- **Haare** abends waschen, um anhaftende Allergene zu entfernen.
- **Bei gereizten Augen eine Sonnenbrille** tragen und bei Bedarf Kühlkompressen anwenden.
- **Autofahrten mit offenen Fenstern vermeiden**; gegebenenfalls Pollenfilter nutzen.
- **Auf Teppiche verzichten**; stattdessen täglich staubsaugen und feucht durchwischen.
- **Bei Hausstaubmilbenallergie** milbendichte Bezüge für Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen verwenden.
- **Hyposensibilisierung** in Erwägung ziehen, wenn die Beschwerden die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen.

1 Lennecke K, Hagel K. Selbstmedikation, Leitlinien zur pharmazeutischen Beratung, 8. Auflage 2025; Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart
2 ARIA-Leitlinie 2019: Behandlung der allergischen Rhinitis im deutschen Gesundheitssystem; online abrufbar unter: <https://www.wehrmann-derms.de/uploads/n2L2u/ARIA-Leitlinie2019BehandlungderAllergischenRhinitis.pdf>

Allergodil akut FORTE

SCHNELLE LINDERUNG
BEI HEUSCHNUPFEN, GENAU DORT, WO ES JUCKT



24h Wirkung

LA ROCHE POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

ALLERGIE?
TOLERIANE DERMALLERGO BERUHIGT SOFORT

**ANTI-POLLEN
ANTI-JUCKREIZ
ANTI-RÖTUNGEN
ANTI-IRRITATIONEN**



*Umfrage unter Dermatologen, AplusA + Partner, Jan. 2021–Juli 2021, in 34 Ländern; die mehr als 82% des weltweiten BIP ausmachen.

DuoAllerg® NASENSPRAY

Antihistaminikum + Corticoid
(Azelastinhydrochlorid und Fluticasonpropionat)
Das Wirkstoffzusammensetzungsverhältnis entspricht Dymista Nasenspray.

- Verringert allergische Reaktionen an Nase und Augen
- Beruhigt das Entzündungsgeschehen



**GALENpharma GmbH • Wittland 13 • 24109 Kiel
Telefon: (0431) 5 85 18-0 • Fax: (0431) 5 85 18-20 • www.galenpharma.de**

GALEN PHARMA



Allergodil akut forte 1,5 mg/ml Nasenspray, Lösung

Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid. Zusammens.: 1 ml Nasenspray, Lösung enth. 1,5 mg Azelastinhydrochlorid. Ein Sprühstoß (0,14 ml) enthält 0,21 mg Azelastinhydrochlorid entsprechend 0,19 mg Azelastin.
Sonst. Bestandt.: Hypromellose, Sucralose (E955), Sorbitol-Lösung 70%, Natriumedetat, Natriumcitrat, Gerein. Wasser. **Anw.:** symptomat. Behandl. d. saisonal. allerg. Rhinitis (Heuschnupfen) bei Erw., Jugendl. u. Kindern ab 6 J. **Gegenanz:** Überempfindlichk. geg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. **Nebenw.:** *Häufig:* Dysgeusie. *Gelegentl.:* Reizung d. Nasenschleimhaut, Niesen, Nasenbluten. *Selten:* Schwindelgef., Somnolenz; Übelk., Abgeschlagenh.* u. Schwächegefühl* (*können auch d. die zugrunde liegende Erkrank. verursacht sein). *Sehr selten:* Überempfindlichk., Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria. 12/2025. Cooper Consumer Health Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 68165 Mannheim **CCH002**

DuoAllerg 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension

Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid und Fluticasonpropionat. **Zusammensetzung:** Ein Sprühstoß (0,14 g) enthält 137 Mikrogramm Azelastinhydrochlorid, entsprechend 125 Mikrogramm Azelastin und 50 Mikrogramm Fluticasonpropionat sowie 0,014 mg Benzalkoniumchlorid; Natriumedetat, Glycerol, Mikrokristalline Cellulose, Carmellose-Natrium, Polysorbat 80, Benzalkoniumchlorid, 2-Phenylethanol, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur intranasalen Anwendung bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung der mittelschweren bis schweren saisonalen Rhinitis, nach deren Erstdiagnose durch den Arzt und wenn eine Monotherapie entweder mit einem intranasalen Antihistaminikum oder einem Glukokortikoid nicht als ausreichend erachtet wird. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig Nasenbluten. Häufig kommt es nach der Anwendung zu einem substanzspezifischen unangenehmen Geschmack (meist aufgrund unsachgemäßer Anwendung, d.h. bei zu weit zurück geneigtem Kopf während der Anwendung). Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich anaphylaktische Reaktionen, Angioödem (Gesichts- oder Zungenödeme und Hautausschlag), Bronchospasmus, Kopfschmerzen, Dysgeusie, unangenehmer Geruch, Schwindel, Somnolenz, Glaukom, Erhöhung des Augeninnendrucks, Katarakt, verschwommenes Sehen, Beschwerden an der Nase (einschließlich Nasenreizung, Brennen, Jucken), Niesen, trockene Nasenschleimhaut, Husten, Halstrockenheit, Rachenreizung, Perforation der Nasensecheidewand, Schleimhauterosion, Nasengeschwüre, Mundtrockenheit, Übelkeit, Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria, Abgeschlagenheit, Schwächegefühl. **Apothekenpflichtig.** Stand: Februar 2025. **GALENpharma GmbH, Wittland 13, 24109 Kiel, Tel.: (0431) 58518-0, Fax: (0431) 58518-20**

MomeAllerg 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension

Wirkstoff: Mometasonfuroat (Ph.Eur.). **Zusammensetzung:** 1 Sprühstoß enth. 50 µg Mometasonfuroat (Ph.Eur.) (als Monohydrat) und 0,02 mg Benzalkoniumchlorid als Kons.-mittel. Sonst. Bestandt.: Glycerol, Polysorbat 80, Mikrok. Cellulose und Carmellose-Natrium, Citronensäure-Monohydrat, Natriumcitrat (Ph.Eur.), Ger. Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur Anw. bei Erwachsenen zur symptomat. Beh. der saisonalen allerg. Rhinitis, nach der Erstdiagnose einer saisonalen allerg. Rhinitis durch einen Arzt. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Mometasonfuroat oder einen sonst. Bestandt. Darf nicht angew. werden, wenn eine unbeh. Inf. im Bereich der Nasenschleimhaut, wie Herpes simplex, vorliegt. Patienten nach Nasenoperationen oder -verletzungen sollten bis zur Ausheilung Kortikosteroide nicht nasal anwenden. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Epistaxis. Häufig: Pharyngitis, Inf. der oberen Atemwege; Kopfschmerzen; Brennen und Reizung in der Nase, nasale Ulzeration; Reizung im Rachen. Nicht bekannt: Überempfindlichkeit einschl. anaphylakt. Reakt., Angioödem, Bronchospasmus, Dyspnoe; Glaukom, erhöhter Augeninnendruck, Katarakte, verschwommenes Sehen; Nasenseptumperforation; Störungen des Geschmacks- und Geruchssinns. System. Wirkungen können bei nasalen Kortikosteroiden auftreten, insb. bei hohen Dosen über längere Zeit. **Warnhinweise:** Enthält Benzalkoniumchlorid, das eine Reizung oder Schwellung der Nasenschleimhaut hervorrufen kann, insb. bei längerer Anw. **Apothekenpflichtig.** Stand: November 2019. **GALENpharma GmbH, Wittland 13, 24109 Kiel, Tel.: (0431) 58518-0, Fax: (0431) 58518-20**

Pollival® 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung. Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid. **Zusammensetzung:** Ein Tropfen von ca. 30 Mikroliter enthält 0,015 mg Azelastinhydrochlorid, Natriumedetat, Hypromellose, Sorbitol, Natriumhydroxid (zur pH-Einstellung), Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Behandlung und Vorbeugung der Symptome der saisonalen allergischen Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. Behandlung der Symptome der nicht saisonalen (perennialen) allergischen Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** *Erkrankungen des Immunsystems:* Sehr selten: Allergische Reaktionen (wie Hautausschlag und Jucken). *Erkrankungen des Nervensystems:* Gelegentlich: Bitterer Geschmack. *Augenerkrankungen:* Häufig: Milde, vorübergehende Reizungen der Augen. **Stand:** September 2017. URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, www.ursapharm.de

Vividrin Azelastin Kombipackung

0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung und 1 mg/ml Nasenspray, Lösung

Wirkstoff: Azelastin-HCl. **Zusammensetzung:** Augentropfen, Lösung: 1ml Lsg. enthält 0,5mg Azelastin-HCl. Ein Tr. enthält 0,015 mg Azelastin-HCl. Sonst. Bestandteil mit bek. Wirkung: Ein Tr. enthält 3,75 µg Benzalkoniumchlorid, entspr. 0,125 mg/ml. Sonst. Bestandteile: Natriumedetat (Ph.Eur.), Hypromellose, Sorbitol-Lösung 70% (nicht kristallisierend) (Ph.Eur.), NaOH-Lsg. (zur pH-Wert-Einstell.), Wasser f. Injektionszwecke. asenspray, Lösung: 1 ml Lsg. Enth. 1 mg Azelastin-HCl. Ein Sprühstoß enth. 0,14 mg Azelastin-HCl. Sonst. Bestandteile: Natriumedetat (Ph.Eur.), Hypromellose 2910, Na₂HPO₄ 12 H₂O (Ph.Eur.), Citronensäure, NaCl, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur symptomat. Beh. von saisonaler allerg. Rhinokonjunktivitis (z.B. Heuschnupfen in Kombination mit allerg. Bindehautentzündung) bei Erwachsenen, Jugendlichen & Kindern ab 6 J. **Gegenanzeigen:** **Überempf.** gegen den WST oder einen der sonst. Bestandteile. **Nebenwirkungen:** **Augentropfen Lösung:** Erkrankungen des Immunsystems: *Sehr selten:* Allerg. Reaktionen (wie Hautausschlag & Juckreiz). Erkrankungen des Nervensystems: *Gelegentlich:* Bitterer Geschmack. *Augenerkrankungen:* *Häufig:* Leichte, vorübergeh. Reizung im Auge. **Nasenspray Lösung:** Erkrankungen des Immunsystems: *Sehr selten:* Überempfindlichkeitsreaktionen, Erkrankungen des Nervensystems: *Häufig:* Bitterer Geschmack, der zuweilen Übelkeit verursachen kann *Sehr selten:* Schwindel, Somnolenz (Benommenheit, Schläfrigkeit), Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums & Mediastinums; *Gelegentlich:* Reizung der bereits entzündlich veränderten Nasenschleimhaut (Brennen, Kribbeln), Niesen, Nasenbluten. Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: *Selten:* Übelkeit Erkrankungen der Haut & des Unterhautzellgewebes: *Sehr selten:* Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht. Allgemeine Erkrankungen & Beschwerden am Verabreichungsort: *Sehr selten:* Abgeschlagenheit (Mattigkeit, Erschöpfung), Schwindel- oder Schwächegefühl (die auch durch das Krankheitsgeschehen selbst bedingt sein können). **Warnhinweise:** Enthält Benzalkoniumchlorid. Packungsbeilage beachten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Apothekenpflichtig. Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, 13581 Berlin, (Stand: Dez 2023)