

Cross-Selling Darmgesundheit (Auswahl)#

Produkt/Hersteller	MYRRHINIL-INTEST® Repha GmbH Biologische Arzneimittel	Kijimea® Reizdarm PRO	OMNi-BiOTiC® 10	IberoBiotics® Pro Bayer	Mutaflor® Ardeypharm
Wirkstoffe/ Bakterienstämme/Hefestämme	100 mg Myrrhe, 50 mg Kaffeekohle, 70 mg Trockenextrakt aus Kamillenblüten (4–6:1); Auszugsmittel: Ethanol 60 % (m/m)	<i>Bifidobacterium bifidum</i> HI-MIMBb75	<i>Bifidobacteria</i> (2 Stämme), <i>Lactobacilli</i> (7 Stämme), <i>Enterococcus</i> (1 Stamm)	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> (LGG®), <i>Bifidobacterium animalis</i> subsp. <i>lactis</i> (BB-12®) und <i>Lactobacillus acidophilus</i> (LA-5®)	<i>Escherichia coli</i> ; Stamm Nissle 1917 (EcN)
Produktstatus	Arzneimittel	Medizinprodukt	Nahrungsergänzungsmittel	Nahrungsergänzungsmittel	Arzneimittel
Einsatzgebiet (NEM*/Medizinprodukt)/ Indikation	Zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen mit unspezifischem Durchfall, begleitet von leichten Krämpfen und Blähungen	Medizinprodukt zur Behandlung eines Reizdarmsyndroms (Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung)	Während und nach der Antibiotika-Einnahme, zum Ausgleich des bakteriellen Ungleichgewichts	Proaktive Ergänzung für den Darm mit vermehrungsfähigen Bakterien	Colitis ulcerosa in der Remissionsphase, chronische Obstipation
Anwendung/Dosierung	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 3 x täglich 4 Tabletten unzerkaut vor den Mahlzeiten.	1 x täglich 2 Kapseln unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) einnehmen.	Während Antibiotika-Therapie: 2 x täglich 1 Beutel in 1/8 l Wasser einrühren, mindestens 1 Minute Aktivierungszeit abwarten, nochmals umrühren und trinken. 1 Stunde Abstand zu Antibiotikum.	1 Kapsel pro Tag. Bei Einnahme zu einer Antibiotika-Therapie 2 Stunden Abstand zum Antibiotikum.	Standarddosis: vom 1.–4. Tag: 1 Kapsel pro Tag, danach 2 Kapseln pro Tag. Bei hartnäckiger Verstopfung kann eine tägliche Einnahme von bis zu 4 Kapseln sinnvoll sein. Einnahme zu einer Mahlzeit, möglichst dem Frühstück.
Dauer der Anwendung	Sollte erst abgesetzt werden, wenn ein geformter Stuhl zu beobachten ist. Zur Langzeiteinnahme geeignet.	Für ein optimales Ergebnis für mindestens 4 Wochen, besser 12 Wochen einnehmen.	Gesamte Antibiotika-Einnahme über, nach Antibiotika-Therapie möglichst noch 14 Tage lang 1 x täglich 1 Beutel einnehmen.	Es wird eine Einnahmedauer von mind. 4 Wochen empfohlen. Anwendung mit Antibiotika: gesamte Antibiotika-Einnahme über und darüber hinaus.	Bei Colitis ulcerosa: Anwendungsdauer 12 Monate. Zur Rezidivprophylaxe kontinuierliche Einnahme. Bei Obstipation bis zu 6 Wochen.
Darreichungsform	Überzogene Tabletten	Kapseln	Pulver in Einzelsachets	Kapseln	Kapseln
Packungsgröße/PZN	50 St. N2, PZN 00697337 100 St. N3, PZN 02756251 200 St., PZN 06612810 500 St., PZN 00697343	14 Kapseln, PZN 15999653 28 Kapseln, PZN 15999676 84 Kapseln, PZN 15999682	10 Sachets, PZN 13584793 20 Sachets, PZN 13584824 30 Sachets, PZN 13947528 40 Sachets, PZN 13584830	30 Kapseln, PZN 17902994	20 Kapseln, PZN 03840686 50 Kapseln, PZN 03840841 100 Kapseln, PZN 03840864
Besonderheiten	Bewährt bei Durchfällen, Krämpfen und Blähungen z. B. im Rahmen von: <ul style="list-style-type: none"> • Magen-Darm-Infekten, • Antibiotika-Therapien, • chronischen Erkrankungen wie Reizdarm, Colitis ulcerosa (Remission), • Pilzinfektionen im Darm. Wirkt entzündungshemmend, stärkt die Darmbarriere und trägt zur Regeneration der Darmschleimhaut bei. Ideal ergänzend zum Probiotikum, pflanzlich und gut verträglich.	Einziges Präparat mit hitzeinaktiviertem Bifidobakterienstamm <i>B. bifidum</i> HI-MIMBb75. Wirksamkeit bei allen RDS-Typen ¹ und allen RDS-Leitsymptomen ¹ klinisch belegt. Breite Evidenzgrundlage durch 2 klinische Studien. ^{1,2} Gut verträglich. Eine erste Linderung der Beschwerden sollte ab ca. einer Woche regelmäßiger Einnahme zu erkennen sein. 1 Andresen V et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020; 5(7): 658–666 2 Guglielmetti S et al. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33(10): 1123–1132	Enthaltene Bakterienstämme siedeln sich nachhaltig im Darm an. Für (Klein-)Kinder steht OMNi-BiOTiC® 10 Kids zur Verfügung. Lagerung bis 40 °C möglich (Außentemperatur sowie Wassertemperatur beim Einrühren).	Die vermehrungsfähigen Bakterien gehören zu den am besten untersuchten Bakterienstämmen weltweit. Bakterienstämme mit hoher Toleranz gegenüber Magensäure und Galle. Einfache Einnahme. Lagerung bei Raumtemperatur, keine Kühlung nötig.	EcN wird ausschließlich im Arzneimittel Mutaflor® eingesetzt. Die Wirksamkeit ist nachgewiesen. ¹ Zur Behandlung von Kindern steht Mutaflor® mite zur Verfügung. 1 Kramer et al. Gastroenterol 2006; 44: 651–656
Leitliniengerechte Anwendung	Empfehlung in der S3-Leitlinie zum Remissionserhalt bei Colitis ulcerosa: Kucharzik T et al. Aktualisierte S3-Leitlinie Colitis ulcerosa (Version 6.1) Februar 2023; AWMF-Registernummer 021/009				Empfehlung in der S3-Leitlinie zum Remissionserhalt bei Colitis ulcerosa: Kucharzik T et al. Aktualisierte S3-Leitlinie Colitis ulcerosa (Version 6.1) Februar 2023; AWMF-Registernummer 021/009
Weitere Informationen	www.myrrhinil.de Alles zum Thema Darmbarriere 	www.kijimea.de 	https://www.omni-biotic.com/de-de 	https://www.iberogast.de/iberobioticspro 	https://www.mutaflor.de 

Dieses Poster beinhaltet eine Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, Medizinprodukten und Arzneimitteln. * NEM = Nahrungsergänzungsmittel