

Pflichttext

Bisoprolol Accord Healthcare 2,5mg/ 5mg/ 10mg Filmtabletten

Zus.: Jede Filmtbl. enth. 2,5mg/ 5mg/ 10mg Bisoprololfumarat (Ph. Eur.) als Wirkstoff. **Sonst. Best.:** Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph. Eur.), Povidon K-30, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich] (E470b). Filmüberzug: Hypromellose (E464), Macrogol 400 (E553). Bei 5 mg u. 10 mg zusätzl.: Titandioxid (E171), Talkum. **Anw.:** Behandl. von Hypert.; Behandl. stabiler chron. Ang. Pect.; Behandl. von stabiler chron. Herzinsuffiz. m. eingeschr. systol. linksventrik. Fkt. Zusätzl. zu ACE-Hemmern u. Diuretika u. opt. Herzglykosiden. **Gegenanz.:** Kontraind. bei Pat. mit chron. Herzinsuffiz. u.: akuter Herzinsuffiz. od. während einer Dekompensation der Herzinsuffizienz, die eine i.v. inotrope Ther. erford.; kardiogenem Schock; AV-Block 2. od. 3. Grades; Sinusknotensyndr. (Sick-Sinus-Syndr.); sinuatrialem Block; symptom. Bradykardie; symptom. Hypot.; schwerem Bronchialasthma; schwere Formen periph. arteriellen Verschlusskrankh. od. schwere Formen des Raynaud-Syndroms; unbehandl. Phäochromozytom; metabolischer Azidose; Überempfindl. gg. Bisoprolol od. sonst. Best. **Nebenw.:** Sehr häufig: Bradykardie (bei Pat. mit chron. Herzinsuffiz.). Häufig: Schwindel*, Kopfschm.*; Verschlecht. d. vorbest. Herzinsuffiz. (bei Pat. mit chron. Herzinsuffiz.), Kälte-od. Taubheitsgef. in Extremit., Hypot. insb. Pat. mit Herzinsuffiz., gastrointest. Beschw. wie Übelk., Erbr., Durchfall, Verstopf., Asthenie (bei Pat. mit chron. Herzinsuffiz.), Müdigk.*. Gelegentl.: Schlafstör., Depress., AV-Überleitungsstör., Verschlecht. d. vorbest. Herzinsuffiz. (bei Pat. mit Hypert. od. Ang. Pect.); Bradykardie (bei Pat. mit Hypert. od. Ang. Pect.), orthostat. Hypot., Bronchospasmen bei Pat. mit Bronchialasthma od. obstrukt. Atemwegserkr. in der Anamnese, Muskelschwäche u. Krämpfe, Asthenie (bei Pat. mit Bluthochdr. od. Ang. Pect.). Selten: Albträume, Halluz., Synkope, verm. Tränenfluss (zu berücks., wenn Pat. Kontaktlinsen ben.), Hörstör., allerg. Rhinitis., Hepatitis, Überempfind.rkt. (Pruritus, Flush, Ausschl. u. Angioödem), erekt. Dysfkt., erh. Triglycerid-Werte, erh. Leberenzym-Werte (ALAT, ASAT). Sehr selten: Konjunktivit., Beta-Blocker könn. eine Psoriasis auslös. od. verschl. od. psoriasisartigen Hautauschl. verurs., Alopezie. *Ausschl. bei Hyperton. od. Ang. Pect.: Symp. treten insb. zu Beginn d. Ther. auf. Im Allg. leichter Natur und verschwind. oft innerh. v. 1 bis 2 Wo. **Warnhinweis:** **Verschreibungspflichtig.** Weitere Informationen siehe Fach- u. Gebrauchsinfo. **Zulassungsinhaber:** Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht, Niederlande. **Örtlicher Vertreter:** Accord Healthcare GmbH, Hansastrasse 32, München, info@accord-healthcare.de. Stand: 12/2022.