

Tapentadol AL 25 mg /-50 mg /-100 mg /-150 mg /-200 mg /-250 mg Retardtabletten

Wirkstoff: Tapentadol.

Zus.: 1 Retardtbl. enth. Tapentadolphosphat entspr. 25 mg/50 mg/100 mg/150 mg/200 mg/250 mg Tapentadol. **Sonst. Bestandt.:** Mikrokrist. Cellulose (E460a), Hypromellose (E464), hochdisp. Siliciumdioxid (E551), Mg-stearat (pflanzl.) (E470b), Glycerol (E422), Talkum (E553b), Titandioxid (E171); Eisen(III)-oxid (E172) (*nur f. 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg*); Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172) (*nur f. 25 mg, 100 mg, 200 mg*); Eisen(II,III)-oxid (E172) (*nur f. 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg*).

Anw.: Behandl. starker, chron. Schmerzen b. Erw., d. nur m. Opioidanalget. angemessen behandelt werden können.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; Situat., i. d. AM m. µ-Opioid-Rezeptor-Agonismus kontraind. sind, wie z.B. b. ausgeprägter Atemdepress. (in nicht überwachten Situat. od. fehl. Reanim.ausrüst.) u. b. akutem od. starkem Bronchialasthma od. Hyperkapnie; besteh. oder Verdacht auf paralyt. Ileus; akute Intoxikat. durch Alkohol, Hypnotika, zentr. wirks. Analgetika od. psychotrope Subst.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Überempf. gg. d. AM (Angioöd., anaphylakt. Reakt. u. Schock), vermind. Appetit, Gewichtsverlust, Angstzustände, depress. Stimm., Schlafstör., Nervos., Ruhelosigk., Desorientierth., Verwirrtheitszustand, Agitierth., Wahrnehm.stör., abnorme Träume, euphor. Stimm., AM-Abhängigk., abnorm. Denken, Delirium, Schwindel, Somnol., Kopfschm., Aufmerksamkeitsstör., Tremor, unwillkürl. Muskelkontrakt., vermind. Bewusstsein, Beeinträcht. d. Erinner.vermögens, ment. Beeinträcht., Synk., Sedier., Gleichgewichtsstör., Dysarthrie, Hypästhesie, Parästhesie, Krampfanfall, Präsynk., Koordinat.stör., Sehstör., erhöhte/erniedr. Herzfrequ., Palpitat., Erröten, erniedr. Blutdruck, Dyspnoe, Atemdepress., Übelk., Verstopf., Erbr., Diarröh, Dyspepsie, Bauchbeschwerden, gestörte Magenentleer., Pruritus, Hyperhidrose, Hautausschlag, Urtik., Harnverhalt, Pollakisurie, sex. Dysfunkt., Asthenie, Müdigk., Gefühl d. Körpertemperaturveränd., trock. Schleimhäute, Öd., AM-Entzugssyndr., Stör. d. Befindens, Reizbark., Trunkenheitsgefühl, Entspann.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig, Betäubungsmittel.

ALIUD PHARMA GmbH, Postfach 1380, 89146 Laichingen

Stand: Oktober 2022