

Ranolazin AL 375 mg /-500 mg /-750 mg Retardtabletten

Wirkstoff: Ranolazin.

Zus.: 1 Tbl. enth. 375 mg/500 mg/750 mg Ranolazin. **Sonst. Bestandt.:** Mikrokrist. Cellulose (E460), Methacyrilsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Na-hydroxid (E524), Hypromellose (E464), Mg-stearat (pflanzl.) (E470b), Hydroxypropylcellulose (E463), Macrogol 8000 (E1521), Titandioxid (E171).

Anw.: Ergänz.ther. b. Erw. zur symptomat. Behandl. f. Pat. m. stab. Ang. pect., d. unzureich. behandelt sind od. antianginöse Mittel d. 1. Wahl (wie Betablocker u./od. Calciumantagon.) nicht toler.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; schwere Nierenfunkt.stör. (Kreat.-Clear. <30 ml/min); mäß. od. schwere Leberfunkt.stör.; begleit. Anw. v. starken CYP3A4-Inhib. (z.B. Itraconazol, Ketoconazol, Voriconazol, Posaconazol, HIV-Proteasehemmer, Clarithromycin, Telithromycin, Nefazodon); begleit. Anw. v. Antiarrhythm. d. Klasse Ia (z.B. Chinidin) od. Klasse III (z.B. Dofetilid, Sotalol) m. Ausnahme v. Amiodaron.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Anorexie, vermind. Appetit, Dehydrat., Hyponatriämie, Beklemm., Insomnie, Verwirrtheitszustände, Halluzinat., Desorientierth., Schwindel, Kopfschm., Lethargie, Synk., (orale) Hypästhesie, Somnol., Tremor, orthostat. Schwindel, Parästhesie, Amnesie, Bewusstseinsvermind., Bewusstlosigk., gestörte Koordinat., Gangstör., Parosmie, Myoklonus, verschwomm. Sehen, Sehstör., Doppelsehen, Vert., Tinnitus, eingeschr. Hörvermögen, Hitzewall., (orthostat.) Hypotonie, periph. Kälte, Dyspnoe, Husten, Epistaxis, Engegefühl im Rachen, Obstipat., Erbr., Übelk., Bauchschn., Mundtrockenh., Dyspepsie, Flatul., Magenbeschwerden, Pankreatitis, eros. Duodenitis, Prur., Hyperhidrose, Angioöd., allerg. Dermatitis, Urtik., kalter Schweiß, Ausschlag, Schmerz i. d. Extremit., Muskelkrampf, Gelenkschwell., Muskelschwäche, Dysurie, Hämaturie, Chromaturie, akutes Nierenversagen, Harnretent., erekta. Dysfunkt., Asthenie, Müdigk., periph. Öd.; erhöhte Werte v.: Blut-Kreatinin, Blutharnstoff, Thrombozyten- od. Leukozytenzahl, Leberenzyme, Serumkreatinin; verläng. korrig. QT-Intervall, vermind. Gewicht, Herzinsuff., TIA, Schlaganfall.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

ALIUD PHARMA GmbH, Postfach 1380, 89146 Laichingen

Stand: März 2023