

Pflichtangaben für Fachkreise

---

**Azelastin/Fluticason AL Nasenspray 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension**

**Wirkstoffe:** Azelastinhydrochlorid/Fluticasonpropionat.

**Zus.:** 1 g Susp. enth. 1.000 Mikrogramm Azelastinhydrochlorid u. 365 Mikrogramm Fluticasonpropionat. 1 Sprühstoß (0,14 g) enth. 137 Mikrogramm Azelastinhydrochlorid (= 125 Mikrogramm Azelastin) u. 50 Mikrogramm Fluticasonpropionat. **Sonst. Bestandt.:** Glycerol, mikrokrist. Cellulose, Carmellose-Na, Na-edetat, Polysorbat 80, Benzalkoniumchlorid-Lsg., 2-Phenylethan-1-ol, gerein. Wasser.

**Anw.:** Lind. d. Sympt. d. mittelschweren bis schweren saison. u. perennialem allerg. Rhinitis, wenn e. Monother. entweder m. e. intranas. Antihistaminikum od. e. Glukokortikoid nicht als ausreich. erachtet wird.

**Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.

**Schwangersch./Stillz.:** Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

**NW:** Überempf.reakt.; einschl. anaphylakt. Reakt., Angioöd. (Gesichts- od. Zungenöd. u. Hautausschlag), Bronchospasmus; Kopfschm., Dysgeusie (unangenehmer Geschmack), unangenehmer Geruch, Schwindel, Somnol. (Benommenh., Schläfrigk.), Glaukom, Erhöh. d. Augeninnendrucks, Katarakt, verschwomm. Sehen, Nasenbluten, Beschwerden a. d. Nase (einschl. Nasenreiz., Brennen, Jucken), Niesen, trock. Nasenschleimhaut, Husten, Halstrockenh., Rachenreiz., Perforat. d. Nasenscheidewand, Schleimhauteros., Nasengeschwüre, Mundtrockenh., Übelk., Hautausschlag, Prur., Urtik., Abgeschlagenh. (Mattigk., Erschöpf.), Schwächegefühl; system. NW mögl.; Wachstumsverzög., Osteoporose.

**Warnhinw.:** Enth. Benzalkoniumchlorid.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

ALIUD PHARMA GmbH, Postfach 1380, 89146 Laichingen

**Stand:** Oktober 2023