

Melatonin STADA® 2 mg Retardtabletten

Wirkstoff: Melatonin.

Zus.: 1 Retardtbl. enth. 2 mg Melatonin. **Sonst. Bestandt.:** Lactose-Monohydrat, Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ B) Ca-hydrogenphosphat-Dihydrat, Talkum, Mg-stearat (pflanzl.), hochdisp. Siliciumdioxid.

Anw.: Monother. f. d. kurzzeit. Behandl. d. primären, durch schlechte Schlafqual. gekennzeichn. Insomnie b. Pat. ab 55 J.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Herpes zoster, Leuko-, Thrombozytopenie, Überempf.reakt., Hypertriglyzeridämie, Hypokalziämie, -natriämie, Reizbark., Nervos., Rastlosigk., Insomnie, anorm. Träume, Albträume, Angst, veränd. Stimm.lage, Aggress., Agitierth., Weinerlichk., Stresssympt., fehl. Orient., frühmorgendl. Erwachen, gesteig. Libido, gedrückte Stimm., Depress., Migräne, Kopfschm., Lethargie, psychomot. Hyperaktiv., Benommenh., Somnol., Synk., Beeinträcht. d. Gedächtnisleist., Aufmerksamkeitsstör., Verträumth., Restless-Legs-Syndr., schlechter Schlaf, Parästh., vermind. Sehschärfe, Verschwommensehen, vermehrter Tränenfluss, (lageabhängig.) Schwindel, Ang. pect., Palpitat., Hypertonie, Hitzewall., Bauchschn., Oberbauchschn., Dyspepsie, Mundgeschwür, Mundtrockenh., Übelk., gastroösophag. Refluxkrankh., Magen-Darm-Stör., Blasen a. d. Mundschleimhaut, Zungengeschwür, Verdauungsstör., Erbr., auffäll. Darmgeräusche, Flatul., Hypersalivat., Halitosis, Bauchbeschwerden, Magenerkrank., Gastritis, Hyperbilirubinämie, Dermatitis, nächtl. Schwitzen, (generalis.) Juckr., (generalis.) Hautausschlag, trock. Haut, Ekzem, Erythem, Handdermatitis, Psoriasis, juck. Hautausschlag, Nagelerkrank., Angioöd., Mundöd., Zungenöd., Schmerzen in d. Extremit., Arthritis, Muskelspasmen, Nackenschm., nächtl. Krämpfe, Glukosurie, Proteinurie, Polyurie, Hämaturie, Nykturie, menopaus. Sympt., Priapismus, Prostatitis, Galaktorrhoe, Asthenie, Schmerzen im Brustraum, Abgeschlagenh., Schmerzen, Durst, abnorme Leberfunkt.werte, Gewichtszunahme, Anstieg v. Leberenzymen, abnorme Blutelektrolyte u. Labortests, Nasopharyngitis, Rückenschm., Arthralgie.

Warnhinw.: Enth. Lactose.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Stand: August 2023