

Lymphdiaral® sensitiv Salbe N

10 g enthalten: Wirkstoffe: Conium Dil. D2 0,4 g, Calendula Ø 0,2 g, Mercurius bijodatus Trit. D5 0,01 g, Stibium sulfuratum nigrum Trit. D2 0,01 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A), Ethanol 86 % (m/m), [(Z)-Octadec-9-en-1yl] oleat, Sorbitol-Lösung 70%. Enthält Cetylstearylalkohol. Die **Anwendungsgebiete** leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung des lokalen Lymphsystems bei Infekten des Hals-Nasen-Rachenraumes. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Korbblütler, einen der anderen Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Sehr selten können juckende Hauthausschläge auftreten, die nach Absetzen der Salbe abklingen. Erstverschlimerung prinzipiell möglich.

Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, D-35383 Gießen

Textstand: 03.2025 RuA