

## Pflichttext für Fachkreise

**Mellozzan® 2 mg, 3 mg, 5 mg.** Wirkst.: Melatonin. Zus.setzg.: 1 Tab. enthält Melatonin 2 mg/3 mg/5 mg.

**Sonst. Best.teile: Tab.inhalt:** Vorverkl. Stärke (Mais), Mikrokristall. Cellul., hochdispers. Si-dioxid, Mg-Stearat (Ph.Eur.) [pflanzlich] **Anw.:** Zur Behandl. v. Schlafst. bei Kindern u. Jugendlichen v. 6 – 17 J. mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS), wenn Schlafhygienemaßn. unzureichend waren. **Gegenanz.:** Überempfindl. gg den Wirkst. o. einen der sonst. Bestandt.. **Nebenw.: Häufig:** Kopfschm., Somnolenz. **Gelegentlich:** Reizbark., Nervosität, Ruhelosigk., Schlafst. (Insomnie), ungew. Träume, Albträume, Angstzust., Migräne, Lethargie, psychomot. Hyperakt., Schwindelgefühl, Hypertonie, Abdominalschmerz i. Oberbauch, Dyspepsie, Mundulzeration, Mundtrockenheit, Übelkeit, Hyperbilirubinämie, Dermatitis, Nachtschweiß, Pruritus, Hautausschl., general. Pruritus, trock. Haut, Schmerzen in den Extremitäten, Glykosurie, Proteinurie, Menopausale Beschw., Asthenie, Schmerzen i. d. Brust, anorm. Leberfunktionstest, Gewichtszunahme. **Selten:** Herpes zoster, Leukopenie, Thrombozytop., Hypertriglyceridämie, Hypokalzämie, Hyponatriämie, Stimmungsschw., Aggression, Agitiertheit, Weinen, Stresssympt., Desorientiertheit, frühmorgendl. Erwachen, gesteigerte Libido, depress. Stimmung, Depression, Synkope (Ohnmacht), Gedächtnisstörg., Aufmerksamkeitsstörg., Verträumtheit, Restless-Legs-Syndr., schlechte Schlafqualität, Parästhesie, ver. Sehschärfe, verschw. Sehen, ver. Tränenfluss, Lagerungsschwindel, Vertigo, Angina pec., Palpitationen, Hitzewallungen, Gastroösophag. Refluxkrankh., Erkr. d. Gastrointestinaltrakts, Blasenbildung d. Mundschleimh., Zungengeschwür, Magen-Darm-Verstimmung, Erbrechen, anormale Darmgeräusche, Blähungen, ver. Speichelfluss, Mundgeruch, abdom. Beschw., Magenbeschw., Gastritis, Ekzem, Erythem, Dermatitis a. d. Händen, Psoriasis, general. Ausschl., juckender Ausschl., Nagelerkrank., Arthritis, Muskelkrämpfe, Nackenschmerzen, nächtl. Krämpfe, Polyurie, Hämaturie, Nykturie, Priapismus, Prostatitis, Ermüdung, Schmerzen, Durst, Erh. Leberenzyme, Elektrolyte im Blut anormal, anormaler Labortest. **Nicht bekannt:** Überempfindlichkeitsreaktion, Hyperglykämie, Angioödem, Ödem i. Mund, Zungenödem, Galaktorrhö. **Verschreibungspflichtig.** Weitere Hinw. s. Fachinfo. **Stand: 11/2024.**

**MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn.** [www.gemeinsam-adhs-begegnen.de](http://www.gemeinsam-adhs-begegnen.de)