

## **Teriflunomid STADA® 14 mg Filmtabletten**

**Wirkstoff:** Teriflunomid.

**Zus.:** 1 Filmtbl. enth. 14 mg Teriflunomid. **Sonst. Bestandt.:** Lactose-Monohydrat, Maisstärke, mikrokrist. Cellulose, Hydroxypropylcellulose, Carboxymethylstärke-Na (Typ A), Talkum, Calciumstearat (pflanzl.), Hypromellose, Titandioxid (E171), Macrogol 8000, Indigocarmin-Al-salz (E132).

**Anw.:** Behandl. erw. Pat. u. v. Kdr. u. Jugendl. ab 10 J. m. schubförmig-remittier. Multipler Sklerose (MS).

**Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; schwere Beeinträcht. d. Leberfunkt. (Child-Pugh-Stadium C); Schwang. od. Frauen im gebärfäh. Alter, d. währ. d. Behandl. u. so lange, wie d. Plasmaspiegel über 0,02 mg/l liegen, keine zuverläss. Verhüt.methode anw. (Schwangersch. v. Beginn ausschließen); still. Frauen; Pat. m. schwer beeinträcht. Immunstatus, z.B. erworb. Immunschwächesyndr. (AIDS); signifik. beeinträcht. Knochenmarkfunkt. od. signifik. Anämie, Leuko-, Neutro- od. Thrombozytopenie; schwere aktive Infekt., bis z. Rückbild.; schwere Nierenfunkt.stör. m. Dialyse (klin. Erfahr. unzureich.); schwere Hypoproteinämie, z.B. b. nephrot. Syndr.

**Schwangersch./Stillz.:** Kontraind.

**NW:** Grippe, Infekt. d. oberen Atemwege, Harnwegsinfekt., Bronchitis, Sinusitis, (Naso-)Pharyngitis, Zystitis, virale Gastroenteritis, Herpes simplex labialis, Zahninfekt., Laryngitis, Tinea pedis, schwere Infekt. einschl. Sepsis, Neutro-, leichte Thrombozytopenie (Thrombozyten <100 G/l), Anämie, leichte allerg. Reakt.; Überempf.reakt. (sofort od. verzög.), einschl. Anaphylaxie u. Angioöd.; Angst, Kopfschm., Par-, Hyperästhesie, Ischialgie, Karpaltunnelsyndr., Neuralgie; periph. Neuropathie, einschl. Polyneuropathie u. Mononeuropathie; Palpitat., (pulmon.) Hypertonie, interstit. Lungenerkrank., Diarröh, Übelk.; Pankreatitis, einschl. Fälle v. nekrotis. Pankreatitis u. Pankreaspseudozyste, akuter Pankreatitis (m. Pseudopapillom); Oberbauchschn., Erbr., Zahnschn., Stomatitis, Kolitis; ALT, AST u. GGT erhöht; akute Hepatitis, AM-bedingter Leberschaden (DILI), Dyslipidämie, Alopecia (Licht. d. Haares, vermind. Haardichte, Haarausfall, Veränd. d. Haartextur), Exanthem, Akne, Nagelerkrank., Psoriasis (einschl. pustul. Psoriasis), schwere Hautreakt., Schmerzen d. Muskel- u. Skelettsystems, Myalgie, Arthralgie, Pollakisurie, Menorrhagie, Schmerz, Asthenie, Gewichtsabnahme, Neutrophilenzahl u./od. Leukozytenzahl erniedr., erhöhte Kreatinin-Phosphokinasewerte im Blut, posttraumat. Schmerzen, Malignome (insbes. lymphoprolif. Erkrank.), Abdominalschn.

**Warnhinw.:** Enthält Lactose.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

**Stand:** Februar 2024