

Erstattungsfähigkeit Melatonin



Informationen für Ihre Apotheke

✓ Erstattungsfähigkeit bei Kindern:

Das verschreibungspflichtige Melatonin Mellozzan® fällt für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren mit Schlafstörungen bei vorliegender ADHS gemäß § 31 Abs. 1 Satz 1 SGB V in die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherungen.

Diagnose muss nicht auf das Rezept

Eine Überprüfung der Verordnungsfähigkeit durch die Apotheke ist nicht erforderlich. Bei Unsicherheiten geben die jeweiligen Arzneiversorgungsverträge Auskunft.

Melden Sie sich bei Fragen gerne unter: Tel.: 02371 937 228 / 02371 937 530

Mellozzan® 2 mg, 3 mg, 5 mg. Wirkst.: Melatonin. Zus.setzg.: 1 Tab. enthält Melatonin 2 mg/3 mg/5 mg. Sonst. Best.teile: Tab.inhalt: Vorverkl. Stärke (Mais), Mikrokristall. Cellul, hochdispers. Si-dioxid, Mg-Stearat (Ph.Eur.) [pflanzlich] Anw.: Zur Behandl. v. Schlafst. bei Kindern u. Jugendlichen v. 6 – 17 J. mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS), wenn Schlafhygiene-maßn. unzureichend waren. Gegenanz.: Überempfindl. gg den Wirkst. o. einen der sonst. Bestandt.. Nebenw.: Häufig: Kopfschm., Somnolenz. Gelegentlich: Reizbark., Nervosität, Ruhelosigk., Schlafst. (Insomnie), ungew. Träume, Albträume, Angstzust., Migräne, Lethargie, psychomot. Hyperakt., Schwindelgefühl, Hypertonie, Abdominalschmerz i. Oberbauch, Dyspepsie, Mundulzeration, Mund-trockenheit, Übelkeit, Hyperbilirubinämie, Dermatitis, Nachtschweiß, Pruritus, Hautausschl., general. Pruritus, trock. Haut, Schmerzen in den Extremitäten, Glykosurie, Proteinurie, Menopausale Beschw., Asthenie, Schmerzen i. d. Brust, anorm. Leberfunktionstest, Gewichtszunahme. Seltен: Herpes zoster, Leukopenie, Thrombozytop., Hypertriglyceridämie, Hypokalzämie, Hyponatriämie, Stimmungsschw., Aggression, Agitiertheit, Weinen, Stresssympt., Desorientiertheit, frühmorgendl. Erwachen, gesteigerte Libido, depress. Stimmung, Depression, Synkope (Ohnmacht), Gedächtnisstörg., Aufmerksamkeitsstörg., Verträumtheit, Restless-Legs-Syndr., schlechte Schlafqualität, Parästhesie, verm. Sehschärfe, verschw. Sehen, verm. Tränenfluss, Lagerungsschwindel, Vertigo, Angina pec., Palpitationen, Hitzewallungen, Gastroösophag. Refluxkrankh., Erkr. d. Gastrointestinaltrakts, Blasenbildung d. Mundschleimh., Zungengeschwür, Magen-Darm-Verstimmung, Erbrechen, anormale Darmgeräusche, Blähungen, verm. Speichelfluss, Mundgeruch, abdom. Beschw., Magenbeschw., Gastritis, Ekzem, Erythem, Dermatitis a. d. Händen, Psoriasis, general. Ausschl., juckender Ausschl., Nagelerkrank., Arthritis, Muskelkrämpfe, Nackenschmerzen, nächtl. Krämpfe, Polyurie, Hämaturie, Nykturie, Priapismus, Prostatitis, Ermüdung, Schmerzen, Durst, Erh. Leberenzyme, Elektrolyte im Blut anormal, abnormaler Labortest. Nicht bekannt: Überempfindlichkeitsreaktion, Hyperglykämie, Angioödem, Ödem i. Mund, Zungenödem, Galaktorrhö. Verschreibungspflichtig. Weitere Hinw. s. Fachinfo. Stand: 11/24. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn.
www.gemeinsam-adhs-begegnen.de

