

## Ichtholan® ortho 50 % Salbe

**Wirkstoff:** Ammoniumbituminosulfonat. Zusammensetzung: 1 g Salbe enthält:

Ammoniumbituminosulfonat (Ichthyol®) 0,5 g.

**Sonstige Bestandteile:** Gelbes Vaselin, mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C<sub>40</sub>-C<sub>60</sub>), Wollwachs, gereinigtes Wasser.

**Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden Behandlung bei Verschleiß des Kniegelenkes (Gonarthrose) sowie bei Prellung und Verstauchung.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B.

Ammoniumbituminosulfonat und/oder Natriumbituminosulfonat oder einen der sonstigen Bestandteile.

**Nebenwirkungen:** Seltener (< 0,1 %): Kontaktallergie, Unverträglichkeitsreaktionen (Jucken, Brennen und/oder stärkere Rötung, Blasenbildung) der Haut.

**Warnhinweis:** Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol.

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, 22335 Hamburg

---

## Ichtholan® spezial

**Wirkstoff:** Ammoniumbituminosulfonat, Trockenrückstand 62%. **Zusammensetzung:** 100 g Salbe enthalten: 85 g Ammoniumbituminosulfonat (Ichthyol®), Trockenrückstand 62%. **Sonstiger Bestandteil:** Wollwachs.

**Anwendungsgebiete:** Zur Kurzzeitanwendung (max. 9 Tage): Zur Behandlung von Belastungsschmerzen bei Gonarthrose.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B. Ammonium- und/oder Natriumbituminosulfonat oder den sonstigen Bestandteil. Nicht anzuwenden bei Haut- und Kinderkrankheiten mit Exanthem, auf offenen Verletzungen, Entzündungen der Haut, Ekzemen oder Schleimhäuten. Schwangerschaft und Stillzeit.

**Nebenwirkungen:** In seltenen Fällen (< 0,1 %) kann eine Kontaktallergie auftreten, so dass die Behandlung abgebrochen werden muss. Leichte Reizungen der Haut (Jucken, Brennen, Rötung). Seltener (< 0,1 %) ist die Reizung der Haut so stark ausgeprägt (Blasenbildung), dass die Behandlung abgebrochen werden muss.

**Warnhinweis:** Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol.

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, 22335 Hamburg

---

## Ichtholan® Zugsalbe 10 % / 20 % / 50 %

**Wirkstoff:** Ammoniumbituminosulfonat. **Zusammensetzung:** 100 g Salbe enthalten:

Ammoniumbituminosulfonat (Ichthyol®) 10 g / 20 g / 50 g. **Sonstige Bestandteile:** Ichtholan® Zugsalbe 10 % / 20 % / 50 %: Gelbes Vaselin, Wollwachs, gereinigtes Wasser; Ichtholan® Zugsalbe 50 % außerdem: Mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C<sub>40</sub>-C<sub>60</sub>).

**Anwendungsgebiete:** Ichtholan® Zugsalbe 10 %: Zur Behandlung einer oberflächlichen entzündlichen Erkrankung der Haut, z. B. Rasierpickel. Ichtholan® Zugsalbe 20 %: Zur Reifung von Furunkeln und oberflächlich abszedierenden Prozessen, z. B. Nagelbett-, Haarbalg-, Schweißdrüsen-Entzündungen, Entzündungen durch Splitter und Dornen. Ichtholan® Zugsalbe 50 %: Zur Reifung von Furunkeln und abszedierenden Prozessen, z. B. Hautabszessen, Nagelbett-, Haarbalg-, Schweißdrüsen-Entzündungen, Entzündungen durch Splitter und Dornen.

**Gegenanzeigen:** Ichtholan® Zugsalbe 10 % / 20 % / 50 %: Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B. Ammonium- und/oder Natriumbituminosulfonat und/oder einen der sonstigen Bestandteile; Ichtholan® Zugsalbe 10 % außerdem: spezifische entzündliche Hautkrankheiten; Ichtholan® Zugsalbe 10 % / 20 %: Schwangerschaft und Stillzeit. Kontakt mit den Augen vermeiden.

**Nebenwirkungen:** Seltener (< 0,1 %) Unverträglichkeitsreaktionen der Haut (heftiges Jucken, Brennen, stärkere Rötung); Ichtholan® Zugsalbe 50 %: in seltenen Fällen (< 0,1 %) Blasenbildung, Kontaktallergie.

**Warnhinweis:** Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol.

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, Sportallee 85, 22335 Hamburg