

Tiotropium STADA® 18 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation

Wirkstoff: Tiotropium.

Zus.: 1 Kapsel enth. 22,5 Mikrogramm Tiotropiumbromid-Monohydrat entspr. 18 Mikrogramm Tiotropium. Die aus d. Mundstück d. Vertical-Haler-Inhalators abgegeb. Dosis beträgt 10 Mikrogramm Tiotropium. **Sonst. Bestandt.:** Lactose-Monohydrat, Gelatine (E441), gerein. Wasser, Macrogol 4000 (E1521), Titandioxid (E171), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172), Brillantblau FCF (E133).

Anw.: Langfristig einzusetz. Bronchodilatator z. Behandl. v. Sympt. b. chron. obstrukt. Lungenerkrank. (COPD).

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst., Milchprotein od. e. d. sonst. Bestandt. od. gg. Atropin od. e. seiner Derivate, wie z.B. Ipratropium od. Oxitropium.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Überempf.reakt. (inkl. Reakt. v. Soforttyp), anaphylakt. Reakt., Dehydrat., Schwindel, Kopfschm., Geschmacksstör., Insomnie, verschwomm. Sehen, Glaukom, erhöhter Augeninnendruck, Vorhofflimmern, (supraventrik.) Tachyk., Palpitat., Pharyngitis, Dysphonie, Husten, Bronchospasmus, Epistaxis, Laryngitis, Sinusitis, trock. Mund, gastroösophag. Reflux, Obstipat., oropharyng. Candidose; intestin. Obstrukt., inkl. paralyt. Ileus; Gingivitis, Glossitis, Dysphagie, Stomatitis, Übelk., Karies, Hautausschlag, Urtik., Juckreiz Angioöd., Hautinfekt., Hautulkus, trock. Haut, Gelenkschwell., Dysurie, Harnverhalt, Harnwegsinfekte, anticholin. Effekte; Milchprotein: allerg. Reakt.

Warnhinw.: Enth. Lactose. Kapseln nicht schlucken!

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Stand: Februar 2024