



Meine drei **persönlichen Gründe** für die Behandlung von Nagelpilz* mit Terbinafin

1. „Der Terbinafin – 1 A Pharma® Nagellack ist **wasserlöslich**, er muss also **nicht abgefeilt** werden. Der Nagellack ist **einfach in der Anwendung** und **trocknet schnell**.“
2. „Der Terbinafin – 1 A Pharma® Nagellack mit dem bewährten Wirkstoff Terbinafin ist **günstiger als andere Nagellacke**.“
3. „**Jetzt ist der beste Zeitpunkt**, mit der Behandlung zu beginnen.
 - Egal ob Sommer oder Winter.
 - Fußnägel benötigen ca. 9 – 12 Monate, um gesund nachzuwachsen.Je frühzeitiger Sie beginnen, desto eher können Sie sich an schönen Nägeln erfreuen.“

Schneller und einfacher geht's nicht!

Unterstützung für Ihre Apotheke.
Fragen Sie Ihren 1 A Pharma Vertrieb.




Unter www.1apharma.de finden Sie weitere Informationen zu unseren Produkten und interessante Serviceartikel.

Terbinafin - 1 A Pharma® Nagellack gegen Nagelpilz 78,22 mg/ml wirkstoffhaltiger Nagellack
Wirkstoff: Terbinafin. **Zusammensetzung:** 1 ml wirkstoffh. Nagellack enth. Terbinafin HCl, entspr. 78,22 mg Terbinafin. **Sonstige Bestandteile:** Ethanol 96 % (95,1 % - 96,9 % (V/V); 92,6 % - 95,2 % (G/G)), (Hydroxypropyl)chitosan, gerein. Wasser. **Anwendungsgeb.**: B. Erw. b. leichten bis mittelschw. Pilzinf d. Nägel, die durch Dermatophyten u./od. and. Terbinafin-empfindl. Pilze verursacht werden. **Gegenanz.**: Überempf. geg. Inhaltsst. Nebenwirk.: Erythem, Hautreizung. **Warnhinw.**: Enth. Alkohol (Ethanol). Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig **Mat.-Nr.** 3/51015050
Stand: Februar 2022 1 A Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen

Art.-Nr.: 49047742 MLR-ID: 433657/042024

Einfach verstehen. www.1apharma.de

SANDOZ



Stark gegen Nagelpilz*

Terbinafin - 1 A Pharma® Nagellack gegen Nagelpilz

DEPOT-EFFEKT

Terbinafin - 1 A Pharma® Nagellack gegen Nagelpilz 78,22 mg/ml
wirkstoffhaltiger Nagellack



Terbinafin

3,3 ml
wirkstoffhaltiger Nagellack N1



Schneller und einfacher geht's nicht!

- ✓ wasserlöslich – ohne Abfeilen
- ✓ schnelltrocknend (30 Sek.)
- ✓ patientengerechte Behandlung:
4 Wochen 1 x täglich, danach 1 x wöchentlich

* Für leichte bis mittelschwere Pilzinfektionen der Nägel, die durch Dermatophyten und/oder andere Terbinafin-empfindliche Pilze verursacht werden.

Einfach verstehen. www.1apharma.de

SANDOZ



Terbinafin – der Nr. 1* Wirkstoff unter den oralen Antimykotika. Jetzt erstmals als Nagellack!



Einfache Anwendung mit bewährtem Wirkstoff für leichte bis mittel-schwere Pilzinfektionen der Nägel, die durch Dermatophyten und/oder andere Terbinafin-empfindliche Pilze verursacht werden.



Wasserlöslich




Ohne aufwändiges Abfeilen



Schnelltrocknend (30 Sek.)



Patientengerechte Behandlung:
Anfangsphase:
4 Wochen **1x täglich**,
Langzeitphase:
1x wöchentlich



- Direktapplikator – vereinfacht **großflächiges Auftragen**
- Auf Hydroxypropylchitosan (HPCH) zur Wirkstoffabgabe in die Nägel basierende, **patentierte Formulierung** von Terbinafin

Für Ihre preisbewussten Kunden!

Terbinafin – 1 A Pharma® Nagellack gegen Nagelpilz 78,22 mg/ml	3,3 ml wirkstoffhaltiger Nagellack	PZN 16874327
	6,6 ml wirkstoffhaltiger Nagellack	16874333

*IQVIA Diagnosis Monitor MAT 01/2024: Anzahl Rezepte gesamt, ATC3: J02A (Antimykotika, Systemisch).


Bewährter Wirkstoff: Terbinafin

Terbinafin ...

- ... ist ein Antimykotikum aus der Gruppe der Allylamine.
- ... hat ein breites Wirkspektrum mit einer fungiziden (pilzabtötenden) Wirkung bei Dermatophyten (Fadenpilzen) und Schimmelpilzen.
- ... stört den Stoffwechsel der Pilzzelle durch Hemmung der Squalen-Epoxidase.

Starker Wirkstoff bei Nagelpilzerkrankungen

Terbinafin ist in vitro schon bei sehr niedrigen Dosierungen wirksam: beste minimale Hemmkonzentration (niedrigste Konzentration, bei der der Pilz abstirbt) bei Dermatophyten.¹



Terbinafin
nur 0,005 bis 0,05 µg/ml




Amorolfine
0,01 bis 0,1 µg/ml



Ciclopirox
3 µg/ml

Der am häufigsten verordnete systemische Wirkstoff bei Pilzinfektionen²



¹ Strassmann K, Kinetik der minimalen Hemmkonzentration verschiedener Antimykotika gegenüber den klinisch isolierten Erregern der Onychomykosen während einer Beobachtungszeit von 20 Wochen, Marburg 2003.
² IQVIA Diagnosis Monitor MAT 01/2024: Anzahl Rezepte gesamt, ATC3: J02A (Antimykotika, Systemisch).


Terbinafin – 1 A Pharma® Nagellack gegen Nagelpilz

Innovation:

- **erster Nagellack** mit dem Wirkstoff Terbinafin auf dem Markt!
- eine auf Hydroxypropylchitosan zur Wirkstoffabgabe in die Nägel basierende, **patentierte Formulierung** von Terbinafin.

Starke lokale Wirkung, wo sie gebraucht wird:

Terbinafin-Konzentration **im Nagel** (9245 µg/g) ist über **1.000-fach höher** als nach oraler Gabe (1 µg/g).¹



Mit Depoteffekt:

Nach einer **Anwendung von 4 Wochen** wird eine Wirkstoffkonzentration im Nagel erreicht, die **bis zu 6 Monate** über der minimalen Hemmkonzentration liegt.²

Unser Tipp für Sie!

Die **Wintersaison** zur Nagelpilzbehandlung nutzen und sich im **nächsten Sommer** an **schönen Nägeln** erfreuen.

Im Winter stecken die Füße in warmen Socken und Schuhen. Ein idealer Zeitraum, um unbemerkt die Nägel zu behandeln. Der gesunde Nagel hat Zeit nachzuwachsen.



¹ FI Terbinafin 02/2022
² Petranyi G, Meingassner JG, Mieth H. Antifungal activity of the allylamine derivative terbinafine in vitro. Antimicrob Agents Chemother. 1987;31(9):1365–8.