

Terbinafin - 1 A Pharma®

Nagellack gegen Nagelpilz
78,22 mg/ml
wirkstoffhaltiger Nagellack



Terbinafin



3,3 ml
wirkstoffhaltiger Nagellack N1



**Nagellack auftragen, einziehen lassen, fertig
– kein Feilen, kein Abtragen, kein Vorbehandeln**

Einfach verstehen. www.lapharma.de

Behandlung von **Nagelpilz***?

**Schneller
und Einfacher
geht's nicht**

SANDOZ



Die Behandlung von Nagelpilz* könnte nicht schneller und einfacher sein:



Kein Feilen
vor der
Anwendung



**Nur 30
Sekunden**
Trocknungszeit



Ab der 5.
Behandlungswoche:
Anwendung nur noch
1x wöchentlich

	Terbinafin¹	Amorolfin²	Ciclopirox³
Feilen	Nein	Ja	Nein
Trocknungszeit	30 Sekunden	10 Minuten	30 Sekunden
Anwendungshäufigkeit	1 x tägl. (bis Woche 4) 1 x wöchentlich (ab Woche 5) ➔ 90% der Behandlungszeit nur einmal wöchentliche Anwendung	1 x wöchentlich	1 x täglich
Behandlungsdauer	Finger: ca. 6 Monate Zehen: ca. 9-12 Monate	Finger: ca. 6 Monate Zehen: ca. 12 Monate	Finger: ca. 6 Monate Zehen: ca. 9-12 Monate

*Für leichte bis mittelschwere Pilzinfektionen der Nagel, die durch Dermatophyten und/oder andere Terbinafin-empfindliche Pilze verursacht werden; 1. Fachinformation Terbinafin – 1 A Pharma® Nagellack gegen Nagelpilz 78,22 mg/ml

2. Fachinformation LOCERYL Nagellack gegen Nagelpilz DIREKT-Applikat. Fachinformation

3. Fachinformation CICLOPOLI gegen Nagelpilz wirkstoffhalt.Nagellack

Der 2in1-Effekt von Terbinafin


1. Zerstört den Pilz auf zellulärer Ebene
2. Depoteffekt: schützt die Nägel 6 Monate lang vor Neuinfektionen

Stark gegen Nagelpilz!*

Terbinafin zeigt in vitro schon bei sehr niedriger Dosierung einen starken Effekt und besitzt die niedrigste minimale Hemmkonzentration (Konzentration, bei der der Pilz abstirbt) unter den lokalen Antimykotika gegen Dermatophyten.¹

Gut zu wissen...

Der am häufigsten verordnete systemische Wirkstoff bei Pilzinfektionen³



Mit Depoteffekt!

Bereits nach einer Anwendung von 4 Wochen wird eine Wirkstoffkonzentration im Nagel erreicht, die bis zu 6 Monate über der minimalen Hemmstoffkonzentration liegt.²

*Für leichte bis mittelschwere Pilzinfektionen der Nägel, die durch Dermatophyten und/oder andere Terbinafin-empfindliche Pilze verursacht werden. 1. Strasmann K, Kinetik der minimalen Hemmkonzentration verschiedener Antimykotika gegenüber den klinisch isolierten Erregern der Onychomykosen während einer Beobachtungszeit von 20 Wochen, Marburg 2003. 2 Petranyi G, Meingassner JG, Mieth H. Antifungal activity of the allylamine derivative terbinafine in vitro. Antimicrob Agents Chemother. 1987;31(9):1365–8. 3. IQVIA Diagnosis Monitor MAT 12/2020: Anzahl Rezepte gesamt, ATC3: J02A (Antimykotika, Systemisch)



Einfach verstehen. www.1apharma.de

Terbinafin - 1 A Pharma Nagellack gegen Nagelpilz 78,22 mg/ml wirkstoffhaltiger Nagellack: **Wirkstoff:** Terbinafin. **Zusammensetzung:** 1 ml wirkstoffh. Nagellack enth. Terbinafin HCl, entspr. 78,22 mg Terbinafin. Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 % (95,1 % - 96,9 % (V/V); 92,6 % - 95,2 % (G/G)), (Hydroxypropyl)chitosan, gerein. Wasser. **Anwendungsgeb.:** B. Erw. b. leichten bis mittelschw. Pilzinf. d. Nägel, die durch Dermatophyten u./od. and. Terbinafin-empfindl. Pilze verursacht werden. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst. **Nebenwirk.:** Erythem, Hautreizung. **Warnhinw.:** Enth. Alkohol (Ethanol). Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig
Mat.-Nr. 3/51015050 Stand: Februar 2022 1 A Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen

SANDOZ

