

**Beclometason/Formoterol STADA® 100 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation  
Druckgasinhalation, Lösung**

**Wirkstoffe:** Beclometasondipropionat / Formoterolfumarat-Dihydrat.

**Zus.:** 1 Sprühstoß (abgeg. v. Ventil) enth.: 100 Mikrogramm Beclometasondipropionat u. 6 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat. Dies entspr. e. über das Mundstück abgegeb. Menge v. 84,6 Mikrogramm Beclometasondipropionat u. 5,0 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat. **Sonst. Bestandt.:** Norfluran (HFA-134a), Ethanol, Salzsäure 0,024%.

**Anw.:** Anw. b. Erw.; **Asthma:** Regelmäß. Behandl. v. Asthma, b. d. d. Anw. e. Kombin.produkts (v. inhalat. Kortikosteroid u. langwirks. Beta-2-Agon.) angemessen ist: b. Pat., d. m. inhalat. Kortikosteroiden u. inhalat. schnellwirks. Beta-2-Agon. z. bedarfsweisen Inhalat. nicht ausreich. eingestellt sind oder b. Pat., d. m. inhalat. Kortikosteroiden u. langwirks. Beta-2-Agon. i. Kombin. bereits ausreich. eingestellt sind. **COPD:** Symptom. Behandl. v. Pat. m. schwerer COPD (FEV<sub>1</sub> <50% d. Normwerts) u. wiederholten Exazerbat. i. d. Vergangenh., d. trotz regelmäß. Ther. m. langwirks. Bronchodilat. erhebl. Sympt. aufweisen.

**Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.

**Schwangersch./Stillz.:** Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

**NW:** Pharyngitis, orale Candidose/Candidamykose, Pneumonie, Influenza, orale Pilzinfekt., Candidose (oropharyng., ösophag., vulvovagin.), Gastroenteritis, Sinusitis, Rhinitis, Granulozyto-, Thrombozytopenie, allerg. Dermatitis; Überempf.reakt. einschl. Ausschlag, Urtik., Prur., Erythem u. Öd. an Lippen, Gesicht, Augen u. Pharynx; Nebennierenrindensuppress., Hypokaliämie, Hyperglykämie, Ruhelosigk., psychomotor. Hyperaktiv., Schlafstör., Angstzustände, Depress., Aggressiv., Verhaltensänd., Kopfschm., Tremor, Schwindel, Glaukom, Katarakt, verschwomm. Sehen, Otosalpingitis, Herzklopfen, Verläng. d. QTc-Intervalls, EKG-Veränd., Tachykardie, -arrhythmie, Vorhofflimmern, ventrik. Extrasystolen, Ang. pect., Hyperämie, Flush (Gesichtsröt.), Dysphonie, Husten, produkt. Husten, Rachenreiz., Asthma-Anfall, paradoxischer Bronchospasmus, Dyspnoe, Asthma-Exazerb., Diarröh, Mundtrockenh., Dyspepsie, Dysphagie, Brennen d. Lippen, Übelk., Geschmacksstör., Prur., Ausschlag, Hyperhidrose, Urtik., Angioöd., Muskelkrämpfe, Myalgie, Wachstumsverzög. b. Kdr. u. Jugendl., Nephritis, periph. Öd., Erhöh. v. C-reakt. Protein, Erhöh. d. Thrombozytenzahl, Erhöh. v. freien Fettsäuren, Insulin u. Ketonkörpern i. Blut, Abnahme d. Kortisol i. Blut, erhöhter, erniedr. Blutdruck, Abnahme d. Knochendichte, Muskelspasmen.

**Warnhinw.:** Enth. fluorierte Treibhausgase u. 7 mg Alkohol (Ethanol) pro Sprühstoß. Das Behältnis enth. e. unter Druck steh. Flüssigk. Lagerungshinw. beachten!

Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

**Stand:** März 2025

**Beclometason/Formoterol STADA® 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Lösung**

**Wirkstoffe:** Beclometasondipropionat / Formoterolfumarat-Dihydrat.

**Zus.:** 1 Sprühstoß (abgeg. v. Ventil) enth.: 200 Mikrogramm Beclometasondipropionat u. 6 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat. Dies entspricht e. über das Mundstück abgegeb. Menge v. 177,7 Mikrogramm Beclometasondipropionat u. 5,1 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat. **Sonst. Bestandt.:** Norfluran (HFA-134a), Ethanol, Salzsäure 0,021%.

**Anw.:** B. Erw. z. regelmäß. Behandl. v. Asthma, b. d. d. Anw. e. Kombin.produkts (v. inhalat. Kortikosteroid u. langwirks. Beta-2-Agon.) angemessen ist: b. Pat., d. m. inhalat. Kortikosteroiden u. inhalat. schnellwirks. Beta-2-Agon. z. bedarfsweisen Inhalat. nicht ausreich. eingestellt sind oder b. Pat., d. m. inhalat. Kortikosteroiden u. langwirks. Beta-2-Agon. i. Kombin. bereits ausreich. eingestellt sind.

**Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.

**Schwangersch./Stillz.:** Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

**NW:** Pharyngitis, orale Candidose/Candidamykose, Pneumonie, Influenza, orale Pilzinfekt., Candidose (oropharyng., ösophag., vulvovagin.), Gastroenteritis, Sinusitis, Rhinitis, Granulozyto-, Thrombozytopenie, allerg. Dermatitis; Überempf.reakt. einschl. Ausschlag, Urtik., Prur., Erythem u. Öd. an Lippen, Gesicht, Augen u. Pharynx; Nebennierenrindensuppress., Hypokaliämie, Hyperglykämie, Ruhelosigk., psychomotor. Hyperaktiv., Schlafstör., Angstzustände, Depress., Aggressiv., Verhaltensänd., Kopfschm., Tremor, Schwindel, Glaukom, Katarakt, verschwomm. Sehen, Otosalpingitis, Herzklopfen, Verläng. d. QTc-Intervalls, EKG-Veränd., Tachykardie, -arrhythmie, Vorhofflimmern, ventrik. Extrasystolen, Ang. pect., Hyperämie, Flush (Gesichtsröt.), Dysphonie, Husten, produkt. Husten, Rachenreiz., Asthma-Anfall, Rachenröt., paradoxaer Bronchospasmus, Dyspnoe, Asthma-Exazerb., Diarröh, Mundtrockenh., Dyspepsie, Dysphagie, Brennen d. Lippen, Übelk., Geschmacksstör., Prur., Ausschlag, Hyperhidrose, Urtik., Angioöd., Muskelkrämpfe, Myalgie, Wachstumsverzög. b. Kdr. u. Jugendl., Nephritis, periph. Öd., Erhöh. v. C-reakt. Protein, Erhöh. d. Thrombozytenzahl, Erhöh. v. freien Fettsäuren, Insulin u. Ketonkörpern i. Blut, Abnahme d. Kortisol i. Blut, erhöhter, erniedr. Blutdruck, Abnahme d. Knochendichte, Muskelpasmen.

**Warnhinw.:** Enth. fluorierte Treibhausgase u. 9 mg Alkohol (Ethanol) pro Sprühstoß. Das Behältnis enth. e. unter Druck steh. Flüssigk. Lagerungshinw. beachten!

Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

**Stand:** März 2025

