

**Pflichttext RIOPAN® Magen Gel**

**DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin**

**RIOPAN® Magen Gel 1600 mg Gel zum Einnehmen**

Wirkstoff: Magaldrat

**Zus.:**

1 Beutel zu 10 ml enth. 1600 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestand.: Silbersulfat, Chlorhexidindigluconat, Arabisches Gummi, Hypromellose, Natriumcyclamat, Simethicon-Emulsion, Karamell-Aroma, Sahne-Aroma, flüssig, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), gereinigtes Wasser.

**Anw.:**

Sodbrennen u. säurebedingte Magenbeschwerden; symptomatische Behandlung von Magen- u. Zwölffingerdarmgeschwüren.

**Gegenanz.:**

Überempfindlichkeit gg. Magaldrat od. einen der sonstigen Bestandteile.

**Nebenw.:**

Sehr häufig: weicher Stuhl; sehr selten: Diarrhoe, Aluminium- und Magnesiumintoxikation bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion und/oder Langzeitanwendung (Symptome sind z.B. Hautrötung, Durst, Hypotonie, Schläfrigkeit, Verlust der Sehnenreflexe durch neuromuskuläre Blockade, Schwäche, Atemdepression, Herzrhythmusstörungen, Koma und Herzstillstand); nicht bekannt: Abdominalschmerzen, Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen; Hypophosphatämie, Nierenrachitis, Osteomalazie (als Folge einer Aluminium- und/oder Magnesiumintoxikation), Neurotoxizität, Enzephalopathie (aufgrund der Einlagerung von Aluminium in das Zentralnervensystem) bei Langzeitanwendung bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.

Stand: 02/2025