

**Wichtige Information zur Lieferfähigkeit von Carbamazepin retard:
Timonil® retard 200 mg und 400 mg von DESTITIN verfügbar**

Hamburg, 01.08.2025

Sehr geehrte Apothekerin, sehr geehrter Apotheker,

aktuell bestehen bundesweit Lieferengpässe bei nahezu allen Herstellern von Carbamazepin retard 200 mg und 400 mg – Timonil® retard ist lieferbar mit folgenden Verfügbarkeiten:

PZN	Artikelname	Packungsgröße	Verfügbarkeit
630586	TIMONIL 200 retard Tabl.	50 St., N1	ca. ab Ende August
630600	TIMONIL 200 retard Tabl.	200 St., N3	2025 voll verfügbar
8871697	TIMONIL 400 retard Tabl.	50 St., N1	alle Packungs-
8871705	TIMONIL 400 retard Tabl.	100 St., N2	größen direkt
8871711	TIMONIL 400 retard Tabl.	200 St., N3	verfügbar

Dank unserer Produktion in Deutschland konnten wir rechtzeitig die Kapazitäten von Timonil® retard erhöhen.

Wichtig für Ihre Beratung in der Apotheke:

Carbamazepin retard steht auf der Substitutionsausschlussliste des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Das bedeutet: Die Abgabe eines anderen wirkstoffgleichen Präparates ist ohne ärztliche Verordnung nicht zulässig. Ein Alternativpräparat darf nur nach ärztlicher Neuausstellung des Rezeptes abgegeben werden.

So gehen Sie korrekt vor:

- Das verordnete Carbamazepin retard ist nicht verfügbar? Kontaktieren Sie die verordnende Ärztin oder den Arzt zwecks Ausstellung eines neuen e-Rezeptes.
- Geben Sie das Alternativpräparat nur nach eindeutiger ärztlicher Vorgabe ab.
- Dokumentieren Sie die Abgabe sorgfältig.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Sicherstellung der Arzneimittelversorgung.

Mit freundlichen Grüßen

DESTITIN ARZNEIMITTEL GMBH



Martin Reis
Director, Head of BU Neurology



Dr. Katrin Kuhn
Director, Head of Medical Affairs & Clinical Development

Geschäftsführer: Philipp Bloching, Oliver Christoph

Vorsitzender des Verwaltungsrates: Markus Lenke, Sitz Hamburg; Amtsgericht Hamburg HRB 4235

Deutsche Bank AG, IBAN: DE34 2007 0000 05711999 00, BIC: DEUTDEHH Commerzbank AG, IBAN: DE93 2004 0000 02871150 00, BIC: COBADEHH
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, IBAN: DE38 3006 0601 0039 6332 86, BIC: DAAEDEDXXX · Steuer-Nr. 4971400485 · US-HdNr. DE118646651

Kombinierter Pflichttext

Timonil® 150 mg /200 mg/300 mg/400 mg/600 mg retard

Timonil® Saft

Timonil® 150mg/200mg/300mg/400mg/600mg retard, Retardtabletten

Timonil® Saft 20mg/ml Suspension zum Einnehmen

Wirkstoff: Carbamazepin.

Verschreibungspflicht.

Zus.: Timonil® 150/200/300/400/600mg retard, Retardtbl.: *Arzneil. wirks. Bestandt.:* 1 Retardtbl. enth. 150/200/300/400/600mg Carbamazepin. *Sonst. Bestandt.:* mikrokrist. Cellulose, Mg-stearat (Ph. Eur) [pflanzlich], Polyacrylat-Dispersion 30% (enth. 1,5% Nonylphenolglykolether), Carboxymethylstärke-Na (Typ A) (Ph. Eur.), hochdisp. Siliciumdioxid, Talkum. Timonil® Saft: *Arzneil. wirks. Bestandt.:* 1ml enth. 20mg Carbamazepin. 1 Applik.-spritze (5ml) enth. 100mg Carbamazepin. *Sonst. Bestandt.:* Propyl(4-hydroxybenzoat) (E216), Methyl(4-hydroxybenzoat) (E218), Aroma, Dinatriumhydrogenphosphat 12 H₂O, Docusat-Natrium, Natriumcyclamat, Kaliumdihydrogenphosphat, Xanthangummi (E415), ger. Wasser.

Anw.gebiete:

Epilepsien: Einfach part. (fokale) u. komplex part. (psychomot.) Anfälle; Grand mal, insbes. fok. Genese (Schlaf-Grand-mal, diffuses Grand mal); gemischte Epilepsieformen. Trigeminus-Neuralg.. Genuine Glossopharyngeus-Neuralg.. Schmerzh. diabet. Neuropath.. Nichterept. Anf. b. Multipler Sklerose, wie z. B. Trigeminus-Neuralg., tonische Anf., paroxysm. Dysarthr. u. Atax., paroxysm. Parästhes. u. Schmerzanf. Anfallsverhüt. b. Alkoholentzugssyndr. (nur unt. station. Bed. anw.). Für Timonil® 150/200/300/400/600mg retard zusätzl.: Z. Prophyl. man.-depress. Phasen, wenn d. Ther. m. Lithium versagt hat bzw. wenn Pat. unt. Lithium schnelle Phasenwechsel erlebten u. wenn m. Lithium n. behandelt werd. darf.

Gegenanz.:

Knochenmarkschädig., auch i. d. Anamn., AV-Block, Überempfindl. gg.d. Wirkstoff od. gg. andere Bestandt. d. Arzneim., bek. Überempfindl. gg. strukturell verwandte Medik. wie trizykl. Antidepress. (z. B. Amitriptylin, Desipramin, Nortriptylin); hepat. Porphyrie, auch i. d. Vorgeschichte (z. B. akute intermitt. Porphyr., Porphyria variegata, - cutanea tarda), gleichz. Beh. m. e. MAO-Hemmer od. Beh. innerhalb v. 14 Tag. n. Absetzen d. MAO-Hemmers, Beh. m. Voriconazol.

Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anwend.:

Arzneim. f. Kdr. unzugängl. aufbewahr.. Enth. Parabene (E216 u. E218).

Nebenwirk.:

Sehr häufig: Somnol., Sedier., Schläfrigkeit., Schwindel, Ataxie, Erschöpf., allerg. Hautreakt. m. u. ohne Fieber, z. B. Urtikaria, Leukopen., Übelk., Erbr., Anstieg d. γ-GT-Werte (üblicherw. nicht klin. relevant). **Häufig:** Thrombozytopen., Eosinophil., Kopfschm., Doppelbild., Akkommodationsstör. (z. B. verschwommen. Sehen), Appetitlosigk., Mundtrockenh., Hyponatriäm., Flüssigkeitsretent., Ödem, Gewichtszun. u. vermind. Plasmaosmolalit. d. selt. zu Wasserintoxikat. m. Erbr., Kopfschm., Verwirrung, Letharg. u. and. neurolog. Anom. führt, Anstieg d. alkal. Phosphatase. **Gelegentl.:** B. ält. Pat. Verwirrth. u. Agitat., unwillkürl. Beweg. (z. B. Tremor, Asterixis, Dyston., Ticks, Stör. d. Okulomotorik m. Nystagm.), Nierenfksstör. (z. B. Albumin-, Hämat-, Oligur., Azotäm.), Bradykard., Herzrhythmusstör., Herzinsuff., Verschlecht. e. vorbesteh. koron. Herzkrank., Erregungsleitungsstör., AV-Block, Hyper- od. Hypoton., Diarrhoe, Obstipat., verzög., mehrere Organsyst. betreff. Überempfindl-Reakt. m. Fieber, Hauausschlag, Vaskulit., Lymphknotenschwell., Pseudolymphom, Gelenkschm., Leukopen., Eosinophil., Vergrößer. v. Leber u. Milz, veränd. Leberfunktionswerte, Vanishing Bile Duct Syndr. Diese Erschein. können i. verschied. Kombi. auftreten u. auch and. Organe wie Lunge, Niere, Bauchspeicheldr., Herzmuskel u. Dickdarm betreffen. Anstieg d.

Kombinierter Pflichttext**Timonil® 150 mg /200 mg/300 mg/400 mg/600 mg retard****Timonil® Saft**

Transaminas., exfoliat. Dermatit., Erythroderm.. *Selten*: Halluzinat. (akust. u. visuell), Depress., depress. od. manische Verstimm., Anorex., Ruhelosigk., aggress. Verhalt., dyskinet. Stör. wie orofaz. Dyskines., Choreoathetose., Sprechstör. (z. B. Dysarthr., verwaschene Sprache), Polyneuropath., periph. Neurit., periph. Neuropath., Parästhes., Paresen, Muskelschwä., Bauchschn., Hepatit. (cholestat., hepatozell., gemischt), Vanishing Bile Duct Syndr., Ikterus, lebensbedrohl. akute Hepatit., Leberversag., Stevens-Johnson-Syndr., Tox. epidermal. Nekrose, Lupus erythematoses disseminatus, Prurit., Leukozytose, Lymphadenopath., Senk. d. Folsäurespieg. i. Blut, vermin. Appetit. *Sehr selten*: Aktivier. latent. Psychos., phob. Stör., Denkerschwernis, Antriebsverarm., Hörstör. (z. B. Tinnitus u. Hyper- u. Hypoakusis, Wahrnehmungsänd. v. Tonhöhen), Kreislaufkoll., Embol. (z.B. Lungenemb.), Thrombophlebit., Geschmacksstör., malig. neurolept. Syndr., Linsentrüb., Konjunktividen, erhöht. Augeninnendruck, Arthralg., Myalg., Muskelkrämpfe, Agranulozyt., aplast. Anämie, Panzytopen., Aplas. d. Erythrozyt., Anämie, hämolyt., megaloblast. Anämie, akut. intermitt. Porphy., Porphyria variegata, Porphyria cutanea tarda, Retikulozyt., Milzvergröß., erhöhte Prolaktin-Spieg., Gynäkomast., Galaktorrhoe, veränd. Schilddrüsenfktsp. (vermind. L-Thyroxin [freies Thyroxin, Thyroxin, Trijodthyronin] u. erhöhtes TSH i. Blut, meist ohne klin. Sympt.), Stör. d. Knochenstoffw. (Serum-Kalzium u. 25-OH-Cholecalciferol vermind.) sehr selten m. Osteomalaz. od. -porose, erhöhte Cholesterinspieg., einschließl. HDL-Cholesterin u. Triglyzeride, Erhöh. d. freien Cortisol s i. Serum, Stomat-, Gingiv-, Glossit., Pankreatit., granulomat. Lebererkrank., tubulointerstit. Nephrit., Nierenvers., and. Harnbeschw. (z. B. häufig. Wasserlass., Dysurie, Pollakisur., Harnretent.), akute allerg. Allgemeinreakt., asept. Hirnhautentzünd. m. Myoklonus u. Eosinophil., anaphylakt. Reakt. u. Angioödeme, Hypersensitivitätsreakt. d. Lunge m. Fieber, Dyspnoe, Pneumonit., Pneumon. (Alveolitiden), Photosensibilit., Erythema exsudat. multiforme et nodosum, Veränd. d. Hautpigment., Purpura, Akne, Hirsutism., Vaskulit., Alopez., vermehrt. Schwitz., sex. Funktionsstör. wie z. B. erekkt. Dysfunkt., vermind. Libido, vermind. männl. Fertilit. u./od. abnorme Spermienogen. (vermind. Spermienanzahl u./od. -beweglichk.), Hypogammaglobulinäm.. *Häufigk. nicht bekannt*: Reaktivi. e. Infekt. m. d. Human. Herpesvirus 6, Knochenmarkinsuffiz., AM-Exanth. m. Eosinophil. u. system. Sympt. (DRESS-Syndr.), akute general. exanthem. Pustulose (AGEP), lichenoide Keratose, Onychomadese, Vitiligo, allerg. Kreuzreakt. m. and. Antiepilept., Hyperammonäm., Gedächtnissstör., Kolitis, Frakturen, Sturz (i. Verb. m. durch Timonil®-Behandl. ausgelöst. Ataxie, Schwind., Somnol., Hypoton., Verwirrtheitszust. u. Sedier.), Lungenfibrose, AV-Block m. Synkop., Hinw. auf vermind. Vit.-B12-Spieg. u. erhöhte Homocystein-Spieg. i. Serum, Retinotox. (n. Absetzen revers.), Verschlecht. d. Sympt. e. Multiplen Sklerose, asept. Meningit.. Es kann unt. Carbamazepin zu e. Anfallshäuf. kommen; insbes. Absencen können verstärkt od. neu auftr. Abn. d. Knochendichte unt. d. Bild d. Osteoporo. b. hin zu patholog. Fraktur. b. Langzeitther..

Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation.DESITIN Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg; www.desitin.de**Stand der Information: November 2023**