

Mellozzan® 1mg/ml Lösung zum Einnehmen. Wirkst.: Melatonin. **Zus.setzg.:** 1 ml Lösung zum Einnehmen enthält 1 mg Melatonin und 1 mg Methyl-4-hydroxybenzoat. **Sonst.**

Best.teile: Glycerol (E 422), Kaliumsorbat (Ph. Eur.) (E 202), Salzsäure 3,6% (zur Einstellung des pH-Werts), Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) (E 218), gereinigtes Wasser. **Anw.:** Zur Behandl. v. Schlafstörungen bei Kind. u. Jugdl. v. 6 – 17 J. mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS), wenn andere gesunde Schlafrouinen unzureichend w. u. zur Kurzzeitbehandl. von Jetlag bei Erw.. **Gegenanz.:** Überempfindl. gg den Wirkst. o. einen der sonst.

Bestandt.. **Nebenw.:** **Häufig:** Kopfschm., Schläfr.k.. **Gelegentl.:** Reizbark., Nervosität, Unruhe, Schlafst., abnorme Träume, Albträume, Nachtschweiß, Angstzust., Unruhe, körperl. Schwäche, Energie- und Antriebslosigk., Migräne, Schwindel, Bluthochdruck, Mundgeschwüre, Mundtrockenheit, Übelkeit, Magenschm., Verdauungsstörg., Hauterkrankungen (Dermatitis, Juckreiz, Hautausschlag, trockene Haut), Schmerzen i. d. Armen u. Beinen, Wechseljahresbeschwerden, Schmerzen i. d. Brust, Ausscheidung v. Glukose i. Urin, zu viel Eiweiß i. Urin, Veränderungen i. d. Zusammensetzung des Blutes, die eine Gelbfärbung d. Haut u. d. Augen verursachen können, anormale Leberfunktionstests, Gewichtszunahme. **Selten:** Gürtelrose (Herpes zoster), verr. Anzahl a. weißen Blutkörperchen, verr. Anzahl a. Blutplättchen, niedriger Kalzium- o. Natriumspiegel im Blut, hohe Blutfettwerte, Stimmungsschw., Aggression, Unruhe, Weinen, Stresssympt., Verwirrtheit (Desorientiertheit), frühmorgendl. Erwachen, gesteigertes sexuelles Verlangen (erhöhte Libido), gedrückte Stimmung, Depression, Ohnmacht, Gedächtnisstörg., Aufmerksamkeitsstörg., Verträumtheit, unangenehmes Gefühl i. d. Beinen (Restless-Legs-Syndrom), schlechte Schlafqualität, Müdigkeit (Fatigue), Sehstörg., verschw. Sehen, erhöhte Tränensekretion, Schwindelgefühl oder Drehschwindel (Vertigo), Schwindelgefühl beim Aufstehen o. Hinsetzen, schnellerer Herzschlag, Schmerzen i. d. Brust, aufgrund von Angina pectoris, Säurereflux, Magen-Darm-Beschwerden, Blasenbildung i. Mund, Zungengeschwüre, Magenverstimmung, Erbrechen, anormale Darmgeräusche, vermehrte Speichelproduktion, Mundgeruch, Blähungen, Magenbeschwerden, Entzündung d. Magenschleimhaut, anormales Hautgefühl (Parästhesie), Hauterkrankungen (Ekzeme, Rötungen, Dermatitis d. Hände, Schuppenflechte, juckender Hautausschlag), Nagelerkrankungen, plötzliches Hitzegefühl (Hitzewallungen), Schmerzen, Gelenkentzündungen, Muskelkrämpfe, Nackenschmerzen, nächtl. Krämpfe, erhöhte Urinmenge, Auftreten v. roten Blutkörperchen i. Urin, nächtl. Harndrang, anhaltende Erektion (Priapismus), Entzündung oder Schwellung der Prostata (Prostatitis), Durst, erhöhte Leberenzyme, anormale Blutelektrolyte u. anormale Labortests. **Nicht bekannt:** Überempfindlichkeitsreaktionen u. Angioödem m. Symptomen wie Anschwellen v. Gesicht, Zunge o. Rachen, Schluckbeschwerden, Nesselausschlag und Atembeschwerden, anormale Milchsekretion, hoher Blutzuckerspiegel. **Verschreibungspflichtig.** Weitere Hinw. s. Fachinfo. **Stand: 01/2024. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn.** www.gemeinsam-adhs-begegnen.de