

Mellozzan® 2 mg, 3 mg, 5 mg Tbl. Wirkst.: Melatonin. **Zus.setzg.:** 1 Tab. enthält Melatonin 2 mg/3 mg/5 mg. **Sonst. Best.teile:** Vorverkl. Stärke (Mais), mikrokristall. Cellul., hochdispers. Sisdioxid, Mg-Stearat (Ph.Eur.) [pflanzlich] **Anw.:** Zur Behandl. v. Schlafst. bei Kind. u. Jugdl. v. 6 – 17 J. mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS), wenn andere gesunde Schlafroutinen unzureichend w.. **Gegenanz.:** Überempfindl. gg den Wirkst. o. einen der sonst. Bestandt.. **Nebenw.:** **Häufig:** Kopfschm., Schläfrigkeit. **Gelegentlich:** Reizbark., Nervosität, Unruhe, Angstzust., Schlafst., abnorme Träume, Albträume, Migräne, Schwindel, Übelkeit, Antriebslosigk., psychomot. Hyperakt., Hypertonie, Unterleibsschm., Verdauungsst., Mundulzeration, Mundtrockenheit, Hyperbilirubinämie, Dermatitis, Juckreiz, Hautausschl., trock. Haut, Nachtschweiß, Schmerzen i. d. Extremitäten, Ausscheidung von Glukose im Urin, überschüssiges Eiweiß im Urin, Menopausale Beschw., Schwächegefühl, Schmerzen in der Brust, Gewichtszunahme. **Selten:** Herpes zoster, Leukopenie, Thrombozytop, niedriger Kalzium- oder Natriumspiegel im Blut, hohe Blutfettwerte, Stimmungsschw., Aggression, Agitiertheit, Weinen, Stresssympt., Desorientiertheit, frühmorgendl. Erwachen, gesteigerte Libido, depress. Stimmung, Depression, Ohnmacht, Gedächtnisstörg., Aufmerksamkeitsstörg., Verträumtheit, Restless-Legs-Syndr., schlechte Schlafqualität, Parästhesie, Sehstörungen, verschw. Sehen, erhöhte Tränensekretion, Vertigo, Schwindelgefühl beim Stehen oder Sitzen, Angina pectoris, schnellerer Herzschlag, Hitzewallungen, Saurereflux, Magen-Darm-Beschwerden, Blasenbildung im Mund, Zungengeschwüre, Magenverstimmung, Erbrechen, anormale Darmgeräusche, Blähungen, verm. Speichelproduktion, Mundgeruch, Magenbeschwerden, Entzündung der Magenschleimhaut, Ekzem, Erythem, Dermatitis a. d. Hände, juckender Hautausschlg., Schuppenflechte, Nagelerkrank., Gelenkentzündungen, Muskelkrämpfe, Nackenschmerzen, nächtl. Krämpfe, erhöhte Urinmenge, nächtl. Harndrang, Auftreten von roten Blutkörperchen im Urin, anhaltende Erektion - die schmerzhaft sein kann - ohne sexuelle Stimulation, Schwellung der Prostata (Prostatitis), Müdigkeit, Schmerzen, Durst, erhöhte Leberenzyme, anormale Blutelektrolyte und anormale Labortests. **Nicht bekannt:** Überempfindlichkeitsreaktion, Hyperglykämie, Angioödem, Ödem im Mund, Zungenödem, Galaktorrhö,. **Verschreibungspflichtig.** Weitere Hinw. s. Fachinfo. **Stand: 11/2024. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn.** www.gemeinsam-adhs-begegnen.de