

**Ticagrelor STADA® 60 mg /- 90 mg Filmtabletten**

**Wirkstoff:** Ticagrelor.

**Zus.:** 1 Filmtabl. enth. 60 mg / 90 mg Ticagrelor. **Sonst. Bestandt.:** Mannitol (E421), Ca-hydrogenphosphat-Dihydrat, Hydroxypropylcellulose (E463), Carmellose-Ca (E 466), Mg-stearat (pflanzl.) (E470b), Hypromellose (E464), Titandioxid (E171); *zus. f. -60 mg:* Eisen(III)-oxid (E172), Macrogol 6000; *zus. f. -90 mg:* Talkum (E553b), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O (E172), Macrogol 8000.

**Anw.:** In Komb. m ASS z. Prävent. atherothrombot. Ereign. b. Erw.: m. akutem Koronarsyndr. (ACS) od. m. e. Myokardinfarkt (MI) i. d. Vorgesch. u. e. hohen Risiko f. d. Entwickl. e. atherothrombot. Ereign.

**Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; aktive patholog. Blut.; intrakran. Blut. i. d. Vorgesch.; schwere Leberfunkt.stör.; gleichz. Anw. m. starken CYP3A4-Inhibit., z.B. Ketoconazol, Clarithromycin, Nefazodon, Ritonavir u. Atazanavir (CAVE: erheb. Anstieg d. Ticagrelor-Konz.).

**Schwangersch./Stillz.:** Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

**NW:** Tumorblut. (z.B. Blut. aufgr. v. Blasenkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs), Blutungsstör., Blut. (z.B. erhöhte Neig. zu Blutergüssen, spont. Hämatome, hämorrhag. Diathese), Thrombot.-thrombozytopen. Purpura, Überempf., einschl. Angioöd., Hyperurikämie, Gicht/Gichtarthritis, Verwirrth., Schwindel, Synk., Kopfschm., intrakran. Blut. (d.h. spont., interventionsbez. od. traumat. intrakran. Blut.), Blut. im Auge (z.B. konjunkt., retin., intraokul. Blut.), Vertigo, Blut. im Ohr, Bradyarrhythmie, AV-Block, Hypotonie, Dyspnoe, Blut. im respirator. Syst. (z.B. Epistaxis, Hämoptysis), gastrointest. Blut. (z.B. Blut. d. Zahnfleisches, rekt. Blut., Blut. e. Magengeschwürs), Diarrhö, Übelk., Dyspepsie, Verstopf., retroperiton. Blut., subkut. od. derm. Blut. (z.B. Ekchymose, Hautblut., Petechien), Hautausschlag, Juckr., Muskelblut. (z.B. Hämarthrose, Muskelblut.), Harnwegsblut. (z.B. Hämaturie, hämorrhag. Zystitis), Blut. im Bereich d. Geschlechtsorgane (z.B. vagin. Blut., Hämatospermie, postmenopaus. Blut.), erhöhte Serumkreatinin-Werte, Blut. nach Eingriffen, traumat. Blut. (z.B. Kontus., traumat. Hämatom, traumat. Blut.).

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

**Stand:** November 2022