

Safinamid AL 50 mg /-100 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Safinamid.

Zus.: 1 Filmtabl. enth. Safinamidmesilat entspr. 50 mg / 100 mg Safinamid. **Sonst.**

Bestandt.: Mikrokrist. Cellulose, Crospovidon Typ A, hochdisp. Siliciumdioxid, Mg-stearat (pflanzl.), Hypromellose (E464), Macrogol 6000 (E1521); Muscovit, beschichtet m. Titandioxid (E555); Titandioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172).

Anw.: Behandl. v. erw. Pat. m. idiopath. Parkinson-Krankheit (PK) als Zusatztherap. zu e. stab. Dosis Levodopa (L-Dopa) (als Monotherapie od. in Kombi. m. and. Parkinson-AM) b. Pat. im mittl. bis Spätstadiu. m. Fluktuation.

Gegenanz.: Überempfindg. gg. d. Wirkst. od. einen d. sonst. Bestandt.; gleichz. Behandl. m. and. MAO-Hemmern; gleichz. Behandl. m. Pethidin; Anw. b. Pat. m. schwerer Beeinträchtigung d. Leberfunkt.; Anw. b. Pat. m. Albinismus, Netzhautdegenerat., Uveitis, erblich bedingte Retinopathie od. schwerer progress. diabet. Retinopathie.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwägung.

NW: Harnwegsinfekt., Bronchopneumonie, Furunkel, Nasopharyngitis, Pyodermie, Rhinitis, Zahninfekt., Virusinfekt., Basalzellkarzinom, Akrochordon, melanozyt. Nävus, seborrhoi. Keratose, Hautpapillom, Anämie, Leuko-, Lymphopenie, Anomalie d. roten Blutkörperchen, Eosinophilie, vermind. u./od. erhöhter Appetit, Hypertriglyceridämie, -cholesterolemie, -glykämie, -kaliämie; Kachexie, Schlaflosigkeit, Halluzinationen, Depressionen, anom. Träume, Angst, Verwirrtheitszustände, Affektlabilität, gesteig. Libido, Psychosen, Unruhe, Schlafstörung, Zwangsstörung, Delirium, Desorientierung, Illusionen, impuls. Verhalten, Libidoverlust, Zwangsgedanken, Paranoia, vorzeit. Ejakulation, Schlafattacken, soziale Phobie, Suizidgedanken, Dyskinesie, Somnolenz, Schwindel, Kopfschmerz, Parkinson-Krankh., Parästhesie, Gleichgewichtsstörung, Hypoästhesie, Dystonie, Dysarthrie, Synkopen, kognit. Störung, Koordinationsstörung, Aufmerksamkeitsstörung, Dysgeusie, Hyporeflexie, radikul. Schmerzen, Restless-Legs-Syndrom, Sedierung, Katarakt, Visustrübung, Skotom, Diplopie, Photophobie, Erkrankung d. Netzhaut, Konjunktiv., Glaukom, Amblyopie, Chromatopsie, diabet. Retinopathie, Erythroopsie; Augenblut., -schmerzen, -lidödem; Hypermetropie, Keratitis, gesteig. Tränensekret., Nachtblindh., Papillenöd., Presbyopie, Strabismus, Vertigo, Herzklopfen, Tachyk., Sinusbradyk., Arrhythmien, Myokardinfarkt, (orthostat.) Hypotonie, Hypertonie, Krampfadern, arter. Spasmus, Arteriosklerose, hypertens. Krise (hoher Blutdruck, Kollaps), Husten, Dyspnoe, Rhinorrhö, Bronchospasmus, Dysphonie, oropharyng. Schmerzen u./od. Spasmus, Übelk., Verstopf., Dyspepsie, Erbrechen, Mundtrockenh., Diarrhoe, Abdominalschmerz, Gastritis, Flatulenz, abdomin. Distension, Speichelhypersekret., gastroösophag. Refluxkrankh., Aphthose

Stomatitis, Magengeschwür, Würgen, Blut. i. ob. GI-Trakt, Hyperbilirubinämie, Hyperhidrose, allgem. Juckr., Photosensibilität, Erythem, Alopezie, Blasen, Kontaktdermatitis, Dermatoze, Ekchymose, lichenoid Keratose, nächtl. Schwitzen, Hautschm., Pigmentstör., Psoriasis, seborrhoi. Dermatitis, Rückenschm., Arthralgie, Muskelspasmen, Muskelrigid., Schmerzen i. d. Extremit., Muskelschwäche, Gefühl d. Schwere, Spondylitis ankylosans, Flankenschm., Gelenkschwell., Schmerzen d. Skelettmuskul., Myalgie, Nackenschm., Osteoarthritis, Synovialzyste, Nykturie, Dysurie Harndrang, Polyurie, Pyurie, verzög. Harnfluss, erekt. Dysfunkt., benigne Prostatahyperplasie, Erkrank. d. Brust, Brustschm., Fatigue, Asthenie, Gangstör., periph. Öd., Schmerzen, Hitzegefühl, vermind. AM-Wirksamk., AM-Unverträglichk., Kältegefühl, Krankheitsgefühl, Pyrexie, Xerosis, Gewichtsverlust, Gewichtszunahme; erhöhte Werte v.: Kreatinphosphokin. im Blut, Triglycer. im Blut, Blutzuckerspiegel, Harnstoff im Blut, alkal. Phosphot. im Blut, Bikarbonat im Blut, Kreatinin im Blut, Lipoprotein niederer Dichte; EKG m. verläng. QT-Zeit, anomaler Leberfunkt.test, anomale Urinanalysewerte, erhöhter u./od. erniedr. Blutdruck, anomaler ophthalmolog. Diagnosetest; erniedr. Werte v.: Kalzium im Blut, Kalium im Blut, Cholesterin im Blut, Hämatokrit, Hämoglobin, INR-Wert, Lymphozytenzahl, Blutplättchenzahl; erhöhte Körpertemperatur, Herzgeräusche, anom. Belastungs-EKG, Stürze, Fußfraktur, Prell., Fettembolien, Kopfverletz., Verletz. d. Mundes, Verletz. d. Skelettsystems, Spielsucht, malignes neurolept. Syndr. (Verwirrth., Schwitzen, Muskelrigid., Hyperthermie, CPK-Anstieg), Serotonin-Syndr. (Verwirrth., Hypertonie, Muskelsteifigk., Halluzinat.); Impulskontrollstör.: Spielsucht, gesteig. Libido, Hypersexual., zwanghaftes Ausgeben v. Geld od. Kaufsucht, Essattacken (Binge-Eating) u. zwanghaftes Essen.

Beeintr. d. Reakt.vermögens mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

ALIUD PHARMA GmbH, Postfach 1380, 89146 Laichingen

Stand: Juli 2025