



# Nintedanib PUREN

eine Alternative zu Ofev®

**Wirkstärken:** 100 mg und 150 mg

**Packungsgrößen:** 60 Stück und **120 Stück**

Profitieren Sie von einer **sehr guten GKV-Rabattvertragsabdeckung** und einer **besonders attraktiven 120-er Packung!**

Exklusive **Startkonditionen** bei ausgewähltem Großhandel (Alliance/GEHE, PHOENIX, NOWEDA):

- ▶ **HAP + 73 Cent**
- ▶ **Valuta** für die Erstbevorratung
- ▶ **Rückgaberecht** auf Erstbestellung



## Anwendungsgebiete

- ▶ **Bei Erwachsenen** zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) sowie anderer chronischer progredient fibrosierender interstitieller Lungenerkrankungen (ILDs).
- ▶ **Bei Kindern** und Jugendlichen (6 - 17 Jahre) zur Behandlung von klinisch signifikanten progredient fibrosierenden interstitiellen Lungenerkrankungen (ILDs).
- ▶ **Bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren** zur Behandlung einer interstitiellen Lungenerkrankung mit systemischer Sklerose (SSc-ILD).

### Nintedanib Puren 100 mg Weichkapseln, Nintedanib Puren 150 mg Weichkapseln

**Zus.:** 100 mg WKA/150 mg WKA: 1 Weichkaps. enth. 100 mg/150 mg Nintedanib (als Esilat). **Sonst. Bestandt.:** Mittelkett. Triglyceride, Hartfett, entölte Phospholipide aus Sojabohnen, Gelatine, Glycerol 85%, Titandioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O (E172), ger. Wasser, Eisen(II,III)-oxid (E172), 2-Propanol, Propylenglycol, Hypromellose. **Anw.:** b. Erw. z. Beh. d. idiopat. Lungenfibrose u. z. Beh. anderer chron. progredient fibrosierender interstit. Lungenerkr.; b. Kind. u. Jugendl. von 6 bis 17 J. z. Beh. v. klin. signifk. progred. fibrosier. interstit. Lungenerkr.; z. Beh. e. interstit. Lungenerkr. b. Erw., Jugendl. u. Kind. ab 6 J. mit syst. Sklerose. **Gegenanz.:** Schwangersch. u. Überempf. gg. d. Wirkstoff, Soja, Erdnuss o. einen d. sonst. Bestandt. **Nebenw.:** Thrombozytopenie, Gewichtsabn., Appetit vermind., Dehydrat., Kopfschm., posterior. reversibl. Enzephalopathiesyndr., Myokardinfarkt, Blutung (u.a. Epistaxis, gastrointest. Blut.), Hypertonie, Aneurysmen u. Arterienissekt., Diarrh., Übelk., Abdominalschm., Erbr., Pankreatitis, Kolitis, arzneimittelbed. Leberschaden, Leberenzym erh., Alanin-Aminotransf./Aspartat-Aminotransf./Gamma-Glutamyltransf. erh., Hyperbilirubinäm., alkal. Phosphatase i. Blut erh., Ausschlag, Pruritus, Alopez., Nierenversag., (nephrot.) Proteinurie, behandlungsbed. patholog. Befunde in d. epiphys. Wachstumsfuge b. Kind. u. Jugendl. **Warnhinweise:** Enth. entölte Phospholipide aus Sojabohnen. Arzneimittel f. Kinder unzugängl. aufbewahren. Wechselwirk., Dosierung u. weitere Hinweise s. Fach-/Gebrauchsinformation. **Abgabestatus:** Verschreibungspflichtig. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Eugia Pharma (Malta) Limited **Mitvertreiber:** Puren Pharma GmbH & Co. KG. **Stand:** Juli 2025