

Ichtholan® Zugsalbe 10 %, 20 %, 50 %

Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat **Zusammensetzung:** 100 g Salbe enthalten:

Ammoniumbituminosulfonat (Ichthyol®) 10 g / 20 g / 50 g. Sonstige Bestandteile: Ichtholan Zugsalbe 10 % / 20 % / 50 %: Gelbes Vaseline, Wollwachs, gereinigtes Wasser; Ichtholan® Zugsalbe 50 %

außerdem: Mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C₄₀-C₆₀). **Anwendungsgebiete:** Ichtholan® Zugsalbe 10 %: Zur Behandlung einer oberflächlichen entzündlichen Erkrankung der Haut,

z. B. Rasierpickel.; Ichtholan® Zugsalbe 20 %: Zur Reifung von Furunkeln und oberflächlich

abszedierenden Prozessen, z. B. Nagelbett-, Haarbalg-, Schweißdrüsen-Entzündungen, Entzündungen durch Splitter und Dornen. Ichtholan® Zugsalbe 50 %:

Zur Reifung von Furunkeln und abszedierenden Prozessen, z. B. Hautabszessen, Nagelbett-, Haarbalg-, Schweißdrüsen-Entzündungen, Entzündungen durch Splitter und Dornen.

Gegenanzeigen: Ichtholan® Zugsalbe 10 % / 20 % / 50 %: Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B. Ammonium- und/oder Natriumbituminosulfonat und/oder einen der sonstigen Bestandteile; Ichtholan® Zugsalbe 10 % außerdem: spezifische entzündliche Hautkrankheiten;

Ichtholan® Zugsalbe 10 % / 20 %: Schwangerschaft und Stillzeit. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Nebenwirkungen: Selten (< 0,1 %) Unverträglichkeitsreaktionen der Haut (heftiges Jucken, Brennen, stärkere Rötung); Ichtholan® Zugsalbe 50 %: in seltenen Fällen (< 0,1 %) Blasenbildung, Kontaktallergie.

Warnhinweis: Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol.

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG, Sportallee 85, 22335 Hamburg