

Nintedanib Accord 100 mg Weichkapseln

Nintedanib Accord 150 mg Weichkapseln

Nintedanib Accord 100 mg/150 mg Weichkapseln.

Wirkstoff: Jede Weichkapsel enthält Nintedanibesilat entspr. 100 mg/150 mg Nintedanib. **Zus.:** *Kapselinhalt:* Mittelkettige Triglyceride, Macrogolglycerollaurate (Ph.Eur.), Phospholipide aus Sojabohnen (E322). *Kapselhülle:* Gelatine, Glycerol, Titan-dioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172). *Drucktinte:* Schellack, Eisen(II,III)-oxid (E172), Ammoniak-Lösung, Propylenglycol (E1520). **Anw.:** Bei Erw. zur Behandl. der IPF. Bei Erw. zur Behandl. anderer chron. Progred. fibros.ILDs. Bei Kindern und Jugendl. im Alter von 6 bis 17 J. zur Behandl. von klin. signif. progred. fibros.ILDs. Zur Behandl. einer ILD bei Erw., Jugendl. und Kindern ab 6 J. mit SSc-ILD. **Gegenanz.:** Schwangersch., Überempfindl. gg. Nintedanib, Erdnuss oder Soja oder sonst. Bestandt. **Nebenw.:** ILD: *Sehr häufig:* Diarrhoe, Übelk., Abdominalschm., Leberenzyme erh. *Häufig:* Gewichtsabn., Appetit verm., Kopfschm., Blutung, Erbrechen, ALT erh., AST erh., GGT erh., Ausschlag. *Gelegentlich:* Thrombozytop., Dehydrat., Myokardinf., Hyperton., Pankreatitis, Kolitis, Arzneimittelbed. Leberschaden, Hyperbilirubinämie, AP im Blut erh., Pruritus, Alopezie, Proteinurie. *Nicht bekannt:* Post. revers. Enzephalopathiesynd., Aneurysmen und Arteriendissekt., Nierenvers. Andere chron. progred. fibros.ILDs: *Sehr häufig:* Appetit verm., Diarrhoe, Übelkeit, Abdominalschm., Erbrechen, Leberenzyme erh., ALT erh. *Häufig:* Gewichtsabn., Kopfschm., Blutung, Hyperton., Arzneimittelbed. Leberschaden, AST erh., GGT erh., AP im Blut erh., Ausschlag. *Gelegentlich:* Thrombozytop., Dehydrat., Myokardinf., Pankreatitis, Kolitis, Hyperbilirubinämie, Pruritus, Alopezie, Proteinurie. *Nicht bekannt:* Post. revers. Enzephalopathiesynd., Aneurysmen und Arteriendissekt., Nierenversagen. SSc-ILD: *Sehr häufig:* Diarrhoe, Übelkeit, Abdominalschm., Erbrechen, Leberenzyme erh. *Häufig:* Gewichtsabn., Appetit vermind., Kopfschm., Blutung, Hyperton., ALT erh., AST erh., GGT erh., AP im Blut erh. *Gelegentlich:* Thrombozytop., Kolitis, Arzneimittelbed. Leberschaden, Ausschlag, Pruritus, Nierenversagen. *Nicht bekannt:* Dehydrat., Post. revers. Enzephalopathiesynd., Myokardinf., Aneurysmen und Arteriendissekt., Pankreatitis, Hyperbilirubinämie, Alopezie, Proteinurie. **Warnhinweise:** Enthält Phospholipide aus Sojabohnen. **Verschreibungspflichtig.** *Weitere Informationen siehe Fach- u. Gebrauchsinfo.* **Zulassungsinhaber:** Accord Healthcare S.L.U., World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spanien **Örtlicher Vertreter:** Accord Healthcare GmbH, Hansastraße 32, 80686 München, info@accord-healthcare.de. **Stand:** 07/2025