

Perampanel STADA® 2 mg / -4 mg / -6 mg / -8 mg / -10 mg / -12 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Perampanel.

Zus.: 1 Tbl. enth. 2 mg / 4 mg / 6 mg / 8 mg / 10 mg / 12 mg Perampanel. **Sonst. Bestandt.:** Lactose-Monohydrat, mikrokrist. Cellulose, niedrig subst. Hydroxypropylcellulose, Povidon K30, Mg-stearat (pflanzl.), Hypromellose, Titandioxid (E171), Talkum, Macrogol 3350, *zusätzl. f. -2 mg, -4 mg, -6mg, -8mg:* Eisen(III)-oxid (E172), *zusätzl. f. -2 mg, -8 mg, -10 mg:* Eisen(III)-hydroxid-oxid - H₂O (E172), *zusätzl. f. -8 mg, -10 mg, -12 mg:* Indigocarmin (E132).

Anw.: Zusatzther. b. fokalen Anfällen m. od. ohne sekund. Generalisier. b. Pat. ab 4 J., od. b. prim. general. tonisch-klonischen Anfällen b. Pat. ab 7 J. m. idiopath. general. Epilepsie (IGE).

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Vermind./erhöht. Appetit, Aggress., Wutgefühle, Angst, Verwirrth., Suizidged., Suizidvers., Halluzin., Psychose, Schwindel, Somnol., Ataxie, Dysarthrie, Gleichgewichtsstör., Reizbark., Diplopie, verschwomm. Sehen, Vertigo, Übelk.; schwere Hautreakt. (SCARs, teilw. tödl.) einschl. DRESS, SJS; Rückenschm., Gangstör., Müdigk., Gewichtszun. Sturz, Agitierth.

Warnhinw.: Enth. Lactose.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Stand: April 2025