

**Adapalen/Benzoylperoxid AL 3 mg/g + 25 mg/g Gel**

**Wirkstoff:** Adapalen/Benzoylperoxid.

**Zus.:** 1 g Gel enth. Adapalen 3 mg (0,3% w/w) u. wasserhalt. Benzoylperoxid, entspr. 25 mg (2,5% w/w) Benzoylperoxid. **Sonst. Bestandt.:** Propylenglycol (E1520), Glycerol, Sepineo P600 (Poly[prop-2-enamid-co-natrium-2-methyl-2-(prop-2-enamido)propan-1-sulfonat], Heptamethylnonan, Polysorbat 80 [pflanzl.], Sorbitanoleat), Poloxamer 124, Natriumedetat, Docusat-Na, gerein. Wasser.

**Anw.:** Topische Behndl. d. Acne vulgaris b. Vorliegen v. Komedonen, Papeln u. Pusteln, b. Erw., Jugendl. ab 12 J.

**Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; Schwangersch.; Frauen, d. e. Schwangersch. planen.

**Schwangersch.:** Kontraind.

**Stillz.:** Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

**NW:** Erythem d. Augenlids, Augenlidöd., anaphylakt. Reakt., Parästhesie (Kribbeln a. Verabreich.ort), Engegefühl i. Rachen, Dyspnoe, atop. Dermatitis, Ekzem, brenn. Gefühl auf d. Haut, Hautreiz. (hauptsächl. Schupp., Trockenh., Erythem u. Brennen/stech. Schmerzen), Erythem, Abschupp. d. Haut, trock. Haut, Pruritus, Hautausschlag, allerg. u./od. irritat. Kontaktdermatitis, Schwell. d. Gesichts, Hautschm. (stech. Schmerzen) u. Bläschen (Vesikel), Hautverfärb. (Hyperpigment. od. Hypopigment.), Urtik., verbrenn.ähnl. Reakt. a. d. Anw.stelle, Sonnenbrand.

**Warnhinw.:** Enth. Benzoessäure, Propylenglycol u. Polysorbat.

Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

ALIUD PHARMA GmbH, Postfach 1380, 89146 Laichingen

**Stand:** August 2025