

Brivaracetam AL 10 mg /-25 mg /-50 mg /-75 mg /-100 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Brivaracetam.

Zus.: 1 Filmtablette enth. 10 mg / 25 mg / 50 mg / 75 mg / 100 mg Brivaracetam. **Sonst.**

Bestandt.: Lactose-Monohydrat, mikrokrist. Cellulose (E460), Hypromellose 2910 (E464), Croscarmellose-Na, hochdisp. Siliciumdioxid (E551), Mg-stearat (pflanzl.) (E470b), Poly(vinylalkohol) (E1203), Calciumcarbonat (E170), Macrogol 4000 (E1521), Talkum (E553b); *zusätzl. f. -25 mg:* Eisen(II,III)-oxid (E172), Eisen(III)-hydroxid-oxid-Hydrat (E172); *zusätzl. f. -50 mg:* Eisen(III)-hydroxid-oxid-Hydrat (E172); *zusätzl. f. -75 mg:* Eisen(II,III)-oxid (E172), Eisen(III)-oxid (E172); *zusätzl. f. -100 mg:* Eisen(II,III)-oxid (E172), Eisen(III)-hydroxid-oxid-Hydrat (E172).

Anw.: Zusatzbehandl. fokaler Anfälle m. od. ohne sekundäre Generalisier. b. Erw., Jugendl. u. Kdr. ab 2 J. m. Epilepsie.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst., and. Pyrrolidon-Derivate od. e. d. sonst. Bestandt.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Influenza, Neutropenie, Typ-I-Allergie, vermind. Appetit, Depress., Angst, Insomnie, Reizbark., Suizidgedanken, psychot. Stör., Aggress., Agitierth., Schwindel, Somnol., Konvuls., Vertigo, Infekt. d. oberen Atemwege, Husten, Übelk., Erbr., Obstipat., SJS, Fatigue, vollend. Suizid od. Suizidversuch, Verhaltensstör., psychomotor. Hyperaktiv.

Warnhinw.: Enth. Lactose.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

ALIUD PHARMA GmbH, Postfach 1380, 89146 Laichingen

Stand: Mai 2025